Инструкция по применению
Анабелла Таблетки покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0,03 мг 28 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Испания
Производитель: Abbott Laboratories
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Дроспиренон+Этинилэстрадиол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 3 мг + 0,03 мг

Описание

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой бледно-желтого цвета, круглые, двояковыпуклые.

Действующее вещество

Дроспиренон+Этинилэстрадиол

Состав

Этинилэстрадиол, дроспиренон.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Контрацепция (предупреждение нежелательной беременности).

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Противопоказания

Препарат Анабелла® противопоказан при наличии любого состояния, указанного ниже. Если какое-либо из этих состояний/заболеваний впервые возникнет на фоне приема препарата, следует немедленно прекратить прием: тромбозы (венозные и артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тромбоз глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), инфаркт миокарда, инсульт), цереброваскулярные нарушения (в т.ч. в анамнезе), состояния, предшествующие тромбозу (в т.ч. транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе, наследственная или приобретенная предрасположенность к развитию венозных или артериальных тромбозов, такая как резистентность к активированному протеину С, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия и антифосфолипидные антитела (антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт), мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее время или в анамнезе, множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза, в т.ч. осложненные поражения клапанного аппарата сердца, фибрилляция предсердий, ожирение (ИМТ более 30 кг/м2), заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий, неконтролируемая артериальная гипертензия, тяжелая дислипопротеинемия, сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, серьезное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией, обширная травма, авиаперелет длительностью более 4 ч, курение в возрасте старше 35 лет, панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе, печеночная недостаточность, заболевания печени тяжелой степени (до нормализации результатов печеночных проб), опухоли печени (доброкачественные или злокачественные), в т.ч. в анамнезе, почечная недостаточность тяжелой степени, острая почечная недостаточность, гормонозависимые злокачественные новообразования половых органов или молочной железы в настоящее время и в анамнезе или подозрение на них, кровотечение из влагалища неясного генеза, беременность или подозрение на нее, период грудного вскармливания, непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция, повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Побочные действия

Со стороны иммунной системы: редко - реакции гиперчувствительности, бронхиальная астма.Со стороны психики: часто - пониженное настроение, нечасто - повышение либидо, снижение либидо.Со стороны нервной системы: часто - головная боль.Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: редко - гипоакузия.