Инструкция по применению
Анаферон Таблетки для рассасывания 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Антитела к гамма интерферону аффинно очищенные
Количество в упаковке: 20
Срок годности: 36.0



Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись ANAFERON

Действующее вещество

Антитела к гамма интерферону аффинно очищенные

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Анаферон® показан к применению у взрослых. Лечение и профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в составе комплексной терапии. Комплексное лечение впервые выявленных и рецидивирующих герпеса губ и генитального герпеса.

Способ применения и дозы

Риска не предназначена для деления таблетки на части. Внутрь, не во время приема пищи. Таблетку держать во рту до полного растворения. ОРВИ, грипп, герпес губ В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме: по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления. При отсутствии улучшения на третий день лечения препаратом острых респираторных вирусных инфекций и гриппа следует обратиться к врачу. С профилактической целью препарат принимают ежедневно 1 раз в день в течение 1-3 месяцев. Генитальный герпес При острых проявлениях генитального герпеса препарат принимают через равные промежутки времени по следующей схеме: 1-3 день – по 1 таблетке 8 раз в день, далее по 1 таблетке 4 раза в день – не менее 3 недель. Для профилактики рецидивов хронической герпесвирусной инфекции – по 1 таблетке в день. Рекомендуемая продолжительность профилактического курса определяется индивидуально и может достигать 6 месяцев

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет. Дефицит лактазы, наследственная непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения препарата Анаферон® у беременных и в период лактации не изучалась. При необходимости приема препарата следует учитывать соотношение «польза-риск»

Особые указания

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы либо при врожденной лактазной недостаточности

Условия хранения

В сухом месте