# Инструкция по применению
# Анальгин Авексима Таблетки 500 мг 20 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Авексима
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метамизол натрия
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 500 мг

## Описание

Анальгин-Авексима таблетки обладают обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием.

## Действующее вещество

Метамизол натрия

## Состав

Активное вещество: метамизол натрия.Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кальция стеарат, сахароза (сахар), тальк.

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

После приема внутрь метамизол натрия быстро гидролизуется в желудочном соке с образованием активного метаболита 4-метил-амино-антипирина, который после всасывания метаболизируется в 4-формил-амино-антипирин и другие метаболиты. После в/в введения метамизол натрия быстро становится недоступным для определения.Метаболиты метамизола натрия не связываются с белками плазмы. Наибольшая часть дозы выводится с мочой в форме метаболитов. Метаболиты выделяются с грудным молоком.

**Показания**

Болевой синдром различного генеза (почечная и желчная колика, невралгия, миалгия, при травмах, ожогах, после операций, головная боль, зубная боль, меналгии). Лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, после еды, взрослым назначают по 250-500 мг 2-3 раза в сутки, максимальная разовая доза – 1000 мг, суточная – 3000 мг. Разовые дозы для детей 8-14 лет – 250-300 мг, кратность назначения 2-3 раза в сутки. Продолжительность приема без консультации с врачом не более 5 дней.

**Противопоказания**

Выраженные нарушения функции почек и/или печени, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, заболевания крови, повышенная чувствительность к производным пиразолона.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

С осторожностью применяют при беременности, особенно в I триместре и в последние 6 недель.

**Побочные действия**

Аллергические реакции: кожная сыпь, отек Квинке, редко - анафилактический шок.Со стороны системы кроветворения: редко, при длительном применении - лейкопения, агранулоцитоз.Местные реакции: при в/м введении - инфильтраты в месте введения.

**Передозировка**

Симптомы: тошнота, рвота, гастралгия, олигурия, гипотермия, снижение артериального давления, тахикардия, одышка, шум в ушах, сонливость, бред,нарушение сознания, острый агранулоцитоз, геморрагический синдром, острая почечная и/или печеночная недостаточность, судороги, паралич дыхательной мускулатуры.Лечение: промывание желудка, солевые слабительные, активированный уголь, проведение форсированного диуреза, гемодиализ, при развитии судорожного синдрома – внутривенное введение диазепама и быстродействующих барбитуратов.

**Взаимодействие с другими препаратами**

При одновременном применении с анальгетиками-антипиретиками, с НПВС возможно взаимное усиление токсических эффектов.При одновременном применении с индукторами микросомальных ферментов печени возможно уменьшение эффективности метамизола натрия.При одновременном применении усиливается активность непрямых антикоагулянтов, пероральных гипогликемических препаратов, ГКС, индометацина вследствие их вытеснения из связи с белками крови под влиянием метамизола натрия.При одновременном применении с производными фенотиазина возможна выраженная гипертермия, с седативными средствами, анксиолитиками - усиливается анальгезирующее действие метамизола натрия, с трициклическими антидепрессантами, пероральными контрацептивами, аллопуринолом - нарушается метаболизм метамизола натрия и повышается его токсичность, с кофеином - усиливается действие метамизола натрия, с циклоспорином - уменьшается концентрация циклоспорина в плазме крови.При применении метамизола натрия в комбинации с питофенона гидрохлоридом (оказывает прямое миотропное действие на гладкую мускулатуру внутренних органов и вызывает ее расслабление) и с фенпивериния бромидом (м-холиноблокатор) происходит взаимное усиление их фармакологического действия, что сопровождается уменьшением болевого синдрома, расслаблением гладких мышц и снижением повышенной температуры тела.

**Особые указания**

При длительном применении необходимо контролировать картину периферической крови.Метамизол натрия применяют в комбинации с питофеноном и фенпивериния бромидом в качестве анальгетического средства со спазмолитическим действием.