Инструкция по применению
Анальгин-хинин Таблетки 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Болгария
Производитель: Софарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метамизол натрия+Хинин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 200 мг +50 мг
Срок годности: 60

Действующее вещество

Метамизол натрия+Хинин

Состав

Активное вещество: метамизол натрия (как 100 %) 200 мг, хинина гидрохлорид 50 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (Авицель РН 101) (75,00 мг), карбоксиметилкрахмал натрия (примогель) (26,00 мг), колидон-25 (повидон) (3,00 мг), тальк (5,00 мг), магния стеарат (1,00 мг). Состав оболочки: тальк (4,10 мг), титана диоксид (1,3005 мг), эудрагид L 12,5 Р (метакриловой кислоты и метилметакрилата сополимер) (1,6832 мг), макрогол 400 (1,100 мг), глицерол (0,280 мг), масло касторовое (0,036 мг), краситель пигментный зеленый (краситель хинолиновый желтый Е 104 + синий патентованный V Е 131) (0,0001 мг).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Болевой синдром различной этиологии, в т.ч.: головная боль, невралгия, артралгия, миалгия, миозит, альгодисменорея, послеоперационная боль, почечная и желчная колики (в комбинации со спазмолитиками). Лихорадочные состояния при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1-2 таблетке 1-3 раза в день. Принимать препарат Анальгин-хинин следует сразу после еды.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата Анальгин-хинин.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

кожная сыпь и зуд боль и тяжесть в животе.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота (в т.ч. кровавая), мелена , боли в эпигастрии, агранулоцитоз, апластическая анемия, геморрагический диатез , головокружение , шум в ушах, клонические и тонические судороги, кардиотоксическое действие, кожная сыпь (буллезная, петехиальная, коре- или тифоподобная), возможен анафилактический шок, кома . Лечение: промывание желудка, назначение слабительных и гастропротекторных препаратов, проведение форсированного диуреза , восстановление дыхания, противошоковые мероприятия, восстановление ОЦК; при необходимости - симптоматическая терапия, при развитии судорог - в/в барбитураты и диазепам . Специфического антидота нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Хинин может потенцировать действие средств, блокирующих нервно-мышечную передачу. Трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы, аллопуринол нарушают метаболизм метамизола натрия в печени и повышают его токсичность. Хлорамфеникол усиливает миелотоксическое действие метамизола натрия. Одновременное применение препарата Анальгин-Хинин с другими анальгетиками-антипиретиками может привести к усилению токсических эффектов. При одновременном применении хинина с аминогликозидными антибиотиками может происходить взаимное усиление ототоксического действия. Барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени ослабляют действие метамизола натрия. Седативные средства и транквилизаторы усиливают анальгезирующее действие метамизола натрия. Одновременное применение метамизола натрия с циклоспорином снижает уровень последнего в крови.

Особые указания

С осторожностью следует назначать Анальгин-хинин пациентам с нарушениями функции печени и почек, с нарушениями зрения и слуха, со стенокардией и сердечной недостаточностью. При длительном (более недели) применении препарата необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени. Желательно контролировать ЭКГ. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В период приема препарата не следует выполнять работу, требующую повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.