Инструкция по применению
Анаприлин Таблетки 10 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пропранолол
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Пропранолол

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: пропранолола гидрохлорид 10 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Артериальная гипертензия.;Стенокардия напряжения, нестабильная стенокардия.; Синусовая тахикардия (в т.ч. при гипертиреозе), наджелудочковая тахикардия.; Тахисистолическая форма мерцания предсердий.;Наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия.;Эссенциальный тремор.;Профилактика мигрени .;Алкогольная абстиненция (ажитация и дрожание).;Тревожность.;Феохромоцитома (вспомогательное лечение).;Диффузно-токсический зоб и тиреотоксический криз (в качестве вспомогательного средства, в т.ч. при непереносимости тиреостатических препаратов).;Симпатоадреналовые кризы на фоне диэнцефального синдрома.

Способ применения и дозы

При приеме внутрь режим дозирования индивидуальный. Начальная доза составляет 20 мг. Разовая доза - 40-80 мг, частота приема - 2-3 раза/сут. Максимальные дозы: 320 мг/сут.

Противопоказания

Гиперчувствительность; AV блокада 5 ст.; синоатриальная блокада; синусовая брадикардия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение пропранолола при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения в этот период необходимо тщательное наблюдение за состоянием плода, за 48-72 ч до родов пропранолол следует отменить.;Следует иметь в виду, что возможно негативное влияние на плод: внутриутробная задержка роста, гипогликемия, брадикардия .;Пропранолол выделяется с грудным молоком. При необходимости применения в период лактации следует установить врачебное наблюдение за ребенком или прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы;Повышенная утомляемость, слабость, головокружение, головная боль, сонливость или бессонница, яркие сновидения,депрессия, спутанность сознания , галлюцинации, тремор, нервозность, беспокойство. ;Со стороны органов чувств;Уменьшение секреции слезной жидкости (сухость и болезненность глаз). ;Со стороны сердечно-сосудистой системы;Синусовая брадикардия , AV блокада (вплоть до развития полной поперечной блокады и остановки сердца), аритмии , развитие (усугубление) хронической сердечной недостаточности , снижение АД, ортостатическая гипотензия, проявление ангиоспазма (усиление нарушения периферического кровообращения, похолодание нижних конечностей, синдром Рейно), боль в груди. ;Со стороны пищеварительной системы; Тошнота, рвота , дискомфорт в эпигастральной области, запор или диарея, нарушения функции печени (темная моча, желтушность склер или кожи, холестаз), изменения вкуса, повышение активности печеночных трансаминаз, ЛДГ. ;Со стороны дыхательной системы;Заложенность носа, бронхоспазм. ;Со стороны эндокринной системы;Изменение концентрации глюкозы крови (гипо- или гипергликемия). ;Со стороны системы кроветворения;Тромбоцитопения (необычные кровотечения и кровоизлияния), лейкопения. ;Дерматологические реакции;Усиление потоотделения, псориазоподобные кожные реакции, обострение симптомов псориаза. ;Аллергические реакции;Зуд, кожная сыпь, крапивница. ;Прочие;Боль в спине, артралгии, снижение потенции, синдром отмены (усиление приступов стенокардии, инфаркт миокарда, повышение АД).

Передозировка

Симптомы: усиление побочных эффектов.;Лечение: симптоматическое.

Условия хранения

В сухом месте