Инструкция по применению
Анауран Капли ушные 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Италия
Производитель: Zambon
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лидокаин+Неомицин+Полимиксин В
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1000000 МЕ+375000 МЕ+4 г/100 мл
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Лидокаин+Неомицин+Полимиксин В

Состав

Действующее вещество: полимиксина В сульфат - 1000000 МЕ, неомицина сульфат - 0,5 г (эквивалентно 375000 МЕ), лидокаина гидрохлорид - 4,0 г;Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид - 0,01 г, пропиленгликоль -44 мл, глицерол - 26,5 г, вода очищенная до 100 мл.Концентрация действующего вещества (%): 100%

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Фармакокинетические исследования не проводились, т.к. препарат предназначен для местного применения и системные эффекты маловероятны.

Показания

Острый и хронический наружный отит, средний острый отит на стадии до перфорации, хронический экссудативный средний отит; послеоперационные гнойные осложнения после радикальной мастоидэктомии, тимпанопластики, антротомии, фенестрации.

Способ применения и дозы

Местно, в наружный слуховой проход с помощью специальной пипетки. После закапывания несколько минут держать голову наклоненной. Взрослым: по 4-5 капель 2-4 раза в сутки, детям: по 2-3 капли 3-4 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Курс лечения не должен превышать 7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата. В период беременности и лактации, а также у детей до 1 года препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и лактации препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача .

Побочные действия

Возможны местные аллергические реакции: гиперемия, зуд и шелушение кожи наружного слухового прохода, которые исчезают без лечения, после отмены препарата. Системные эффекты маловероятны вследствие низких доз используемого препарата. Однако, при длительном лечении возможно появление системных эффектов, в частности, ототоксичности и нефротоксичности вследствие всасывания неомицина.

Передозировка

В литературе не описаны случаи передозировки.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с мономицином, стрептомицином, гентамицином, амикацином, нетилмицином (возможно усиление ототоксического действия вышеперечисленных антибиотиков).

Особые указания

Анауран применяется исключительно при заболеваниях уха. При тяжелых и стойких инфекциях местное лечение необходимо дополнить системным применением антибиотиков.Длительное применение Анаурана, как и других антибиотиков, может привести к развитию суперинфекции резистентными к препарату микроорганизмами. У детей до 1 года препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача.

Условия хранения

В сухом месте