Инструкция по применению
Андипал Авексима Таблетки 20 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Анжеро-Судженский ХФЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бендазол+Метамизол натрия+Папаверин+Фенобарбитал
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 20 мг +250 мг +20 мг +20 мг
Срок годности: 30.0

Действующее вещество

Бендазол+Метамизол натрия+Папаверин+Фенобарбитал

Состав

Метамизол натрия (анальгин) 250 мг;фенобарбитал 20 мг;бендазол (дибазол) 20 мг; папаверина гидрохлорид 20 мг;Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 46 мг, тальк - 7 мг, стеариновая кислота - 3 мг, кальция стеарат - 4 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

— болевой синдром (слабо или умеренно выраженный) при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов: почечная колика, желчная колика, кишечная колика; дискинезия желчевыводящих путей; постхолецистэктомический синдром; спазм мочеточников и мочевого пузыря; альгодисменорея; — спазм сосудов головного мозга, мигрень; — в качестве вспомогательного лекарственного средства: болевой синдром после хирургического вмешательства и диагностических процедур.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым и детям старше 8 лет по 1 таблетке 2-3 раза/сут. Длительность применения без консультации врача не должна превышать 7 дней .

Противопоказания

— гиперчувствительность (в т.ч. к производным пиразолона); — угнетение костномозгового кроветворения; — выраженная печеночная и/или почечная недостаточность; — дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; — дети младше 8 лет; — беременность; — период лактации; — тахиаритмии; — тяжелая стенокардия; — коллапс; — декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность; — закрытоугольная глаукома; — гиперплазия предстательной железы; — кишечная непроходимость; — мегаколон.

Побочные действия

Аллергические реакции.;Со стороны ЦНС: сонливость, снижение скорости психомоторных реакций.;Со стороны ЖКТ: тошнота, запор.;Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия.;При длительном применении: лейкопения, агранулоцитоз, нарушение функции печени и почек.

Взаимодействие с другими препаратами

Комбинация с нитратами (нитроглицерин, нитросорбид, сустак и др.), блокаторами кальциевых каналов (нифедипин, коринфар и др.), бета-адреноблокаторами (анаприлин, метопролол, талинолол и др.), ганглиоблокаторами (пентамин и др.), диуретиками (фуросемид, гипотиазид и др.), миотропными спазмолитиками (дипиридамол, эуфиллин и др.) усиливает гипотензивное действие указанных препаратов.;Одновременное применение с другими ненаркотическими анальгетиками может привести к взаимному усилению токсических эффектов.;Совместное применение с адсорбентами, вяжущими и обволакивающими средствами снижает всасывание препарата в ЖКТ.

Особые указания

При длительном (более 7 дней) применении необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени. При отсутствии эффекта в течение 3- х дней следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу .;Во время лечения следует отказаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций .;Детям и подросткам до 18 лет препарат следует применять только по назначению врача.

Условия хранения

В сухом месте