Инструкция по применению
Андрокур таблетки 100 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Байер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ципротерон
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 60.0



Действующее вещество

Ципротерон

Состав

Ципротерона ацетат, микро 20 100 мг;Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 193 мг, крахмал кукурузный - 100 мг, повидон 25 000 - 4 мг, магния стеарат - 3 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Препарат полностью всасывается после приема внутрь. Cmax препарата в сыворотке крови достигается в среднем через 2.8±1.1 ч. Связывание с белками (преимущественно с альбуминами) сыворотки крови составляет около 96%.;T1/2 составляет 42.8±9.7 ч. Подвергается биотрансформации в печени, выводится в основном в виде метаболитов с желчью и мочой, часть препарата выводится в неизмененном виде. Соотношение препарата в моче и желчи составляет 3:7.

Показания

— метастазирующий или неоперабельный рак предстательной железы (без и после орхиэктомии, а также в сочетании с агонистами гонадотропин - рилизинг гормона).

Способ применения и дозы

Для лечения рака предстательной железы Андрокур назначается в дозе 200-300 мг /сут, разделенной на 2-3 приема, ежедневно длительно. При появлении признаков прогрессирования заболевания препарат следует отменить.;Таблетки Андрокура следует принимать после еды, запивая их небольшим количеством воды.

Противопоказания

— выраженные нарушения функции печени; — синдром Дубина-Джонсона и синдром Ротора; — опухоли печени, в т.ч. в анамнезе (за исключением метастатического поражения печени); — тяжелые хронические депрессивные состояния; — текущие тромбоэмболические процессы; — кахексия (если она не связана с раком предстательной железы); — повышенная чувствительностью к ципротерону или к другим составным компонентам препарата.;Следует применять с осторожностью при следующих заболеваниях: тромбоэмболические процессы в анамнезе, тяжелый сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, серповидно-клеточная анемия.

Побочные действия

В начале лечения могут отмечаться боли в животе, тошнота, повышенная утомляемость, сухость кожи, апатия, депрессивные состояния или состояние беспокойства, снижение способности концентрации внимания.;Редко могут наблюдаться аллергические реакции, увеличиваться или уменьшаться масса тела. Возможно появление гинекомастии и подавление сперматогенеза, обратимого снижения полового влечения и потенции. Длительное подавление выработки андрогенов в редких случаях может привести к возникновению остеопороза. В единичных случаях при применении высоких доз наблюдаются чувство нехватки воздуха и нарушения функции печени.

Передозировка

Ципротерон - практически нетоксичное средство. При непреднамеренном однократном приеме в дозе, многократно превышающей терапевтическую, ожидать острой интоксикации не следует.

Взаимодействие с другими препаратами

Антигонадотропное действие ципротерона ацетата усиливается при его комбинированном применении с агонистами гонадотропин-рилизинг гормона.;Под действием ципротерона ацетата уменьшается первоначальное повышение выработки тестостерона, вызываемое агонистами гонадотропин-рилизинг гормона.

Особые указания

Лечение Андрокуром следует проводить под контролем функции печени, коры надпочечников и картины периферической крови.;При наличии признаков гепатотоксичности прием препарата следует отменить.;У больных сахарным диабетом может потребоваться коррекция дозы инсулина или других гипогликемических препаратов (контроль уровня глюкозы должен проводиться чаще, чем обычно).; Негативного влияния Андрокура на фертильность после прекращения лечения не отмечено.;Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;В период лечения необходимо воздерживаться от видов деятельности, требующих повышенного внимания.

Условия хранения

В сухом месте