Инструкция по применению
Ангидак спрей 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Гротекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензидамин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.255 мг



Описание

Нестероидное противовоспалительное средство для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии

Действующее вещество

Бензидамин

Состав

бензидамина гидрохлорид 0.255 мг Вспомогательные вещества: этанол 95% - 13.89 мг, глицерол (глицерин) - 8.52 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.17 мг, ароматизатор ментоловый - 0.051 мг, натрия сахаринат - 0.041 мг, натрия гидрокарбонат - 0.019 мг, полисорбат 20 - 0.009 мг, натрия гидроксида раствор 1 М или раствор хлористоводородной кислоты 0.5 М - до pH 5.0-7.0, вода д/и - до 170 мкл.

Форма выпуска

Спрей

Показания

Для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии: воспалительные заболевания полости рта и горла, в качестве дополнительного средства при консервативной терапии после экстракции зуба, после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти), калькулезное воспаление слюнных желез. Для местного применения в акушерстве и гинекологии: в послеродовом периоде для профилактики послеродовых инфекционных осложнений, специфические вульвовагиниты (в составе комплексной терапии), неспецифические вульвовагиниты и цервиковагиниты любой этиологии (включая вторично развившиеся на фоне химиотерапии и радиотерапии), бактериальный вагиноз, профилактика постоперационных инфекционных осложнений в оперативной гинекологии.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Местно применяется 1-2 раза/сут.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бензидамину.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью применять при беременности и в период лактации.

Особые указания

Не рекомендуется применять для полоскания полости рта у детей в возрасте до 12 лет. Применяют в составе комбинированных препаратов.