Инструкция по применению
Ангидак Спрей 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Гротекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензидамин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.255 мг

Действующее вещество

Бензидамин

Состав

Спрей для местного применения дозированный в виде бесцветного или слегка желтоватого прозрачного раствора с характерным запахом мяты. 1 доза: Активные вещества: бензидамина гидрохлорид 0.255 мг; Вспомогательные вещества: этанол 95% - 13.89 мг, глицерол (глицерин) - 8.52 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.17 мг, ароматизатор ментоловый - 0.051 мг, натрия сахаринат - 0.041 мг, натрия гидрокарбонат - 0.019 мг, полисорбат 20 - 0.009 мг, натрия гидроксида раствор 1 М или раствор хлористоводородной кислоты 0.5 М - до pH 5.0-7.0, вода д/и - до 170 мкл. 30 мл (176 доз) - флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) - пачки картонные.

Форма выпуска

Спрей

Показания

Симптоматическая терапия болевого синдрома воспалительных заболеваний полости рта и ЛОР-органов: гингивит, глоссит, стоматит (в том числе после лучевой химиотерапии); фарингит, ларингит, тонзиллит; кандидоз слизистой оболочки полости рта (в составе комбинированной терапии); калькулезное воспаление слюнных желез; после оперативных вмешательств и травм (тонзилэктомия, переломы челюсти); после лечения или удаления зубов; пародонтоз. При инфекционных и воспалительных заболеваниях, требующих системного лечения, необходимо применение препарата в составе комбинированной терапии.

Способ применения и дозы

Местно. Взрослым и пациентам пожилого возраста назначают по 4-8 доз каждые 1,5-3 часа. Детям в возрасте 3-6 лет - по 1-4 дозы (максимально - 4 дозы) каждые 1,5-3 часа. Детям в возрасте 6-12 лет - по 4 дозы каждые 1,5-3 часа. Курс лечения: при воспалительных заболеваниях полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии): от 4 до 15 дней; при одонто-стоматологической патологии: от 6 до 25 дней; после оперативных вмешательств и травм (тонзилэктомия, переломы челюсти): от 4 до 7 дней. При применении препарата в течение длительных сроков (более 7 дней), необходима консультация врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бензидамину.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью применять при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Со стороны дыхательной системы: очень редко (< 0,01 %) - ларингоспазм. Местные реакции: сухость во рту, чувство онемения, жжения в ротовой полости. Аллергические реакции: кожная сыпь.

Особые указания

Не рекомендуется применять для полоскания полости рта у детей в возрасте до 12 лет.