Инструкция по применению
Ангин-Хель СД Таблетки для рассасывания гомеопатические 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 30 мг +30 мг +30 мг +30 мг +60 мг +60 мг
Срок годности: 60

Описание

Биорегуляционный немецкий препарат для лечения тонзиллита (ангины).

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Hydrargyrum bicyanatum (Гидраргирум бицианатум) D8 30 мг, Phytolacca americana (Фитолякка американа) D4 30 мг, Apis mellifica (Апис меллифика) D4 30 мг, Arnica montana (Арника монтана) D4 30 мг, Hepar sulfuris (Гепар сульфурис) D6 60 мг, Atropa bella-donna (Атропа белла-донна) D4 60 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Тонзиллит

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 12 лет принимают препарат по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса или час (но не более 12 таблеток в день). Длительность применения препарата, в зависимости от выраженности симптомов заболевания, составляет от 7-10 дней до 3-4 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом. Применение препарата у детей от 3 до 12 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства Астровых (Сложноцветных), детский возраст (до 3 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. После применения препарата Ангин-Хель СД может наблюдаться увеличение слюноотделения, прием препарата в этом случае следует прекратить.

Передозировка

При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его составе лактозы.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При рецидивирующих воспалительных заболеваниях миндалин и устойчивой (в течение более 3 дней) повышенной температуре тела или при ее повышении выше 39 °С, а также при всех неясных или устойчивых симптомах следует обратиться к врачу. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности. Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

Условия хранения

В сухом месте