Инструкция по применению
Ангиофлюкс капсулы 250ле N50

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Италия
Производитель: Фарма Вам
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Сулодексид
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 250 ЛЕ
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Сулодексид

Состав

Сулодексид 250 ЛЕ* Вспомогательные вещества: глицерил каприлокапрат (миглиол 812), натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный. Состав оболочки капсул: желатин, глицерол, этилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, краситель железа оксид красный (Е172). * - липопротеинлипазная единица.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Ангиопатии с повышенным риском тромбообразования (в т.ч. после перенесенного инфаркта миокарда); нарушение мозгового кровообращения (включая острый период ишемического инсульта и период раннего восстановления); дисциркуляторная энцефалопатия, обусловленная атеросклерозом, сахарным диабетом, артериальной гипертензией; сосудистая деменция; окклюзионные поражения периферических артерий (в т.ч. атеросклеротического и диабетического генеза); флебопатии, тромбозы глубоких вен; микроангиопатии (нефропатия, ретинопатия, невропатия) и макроангиопатии при сахарном диабете (синдром диабетической стопы, энцефалопатия, кардиопатия); тромботические состояния, антифосфолипидный синдром (в составе комбинированной терапии с ацетилсалициловой кислотой); для продолжения терапии при развитии гепарининдуцированной тромботической тромбоцитопении.

Способ применения и дозы

Индивидуальный, в зависимости от клинической ситуации.

Противопоказания

Геморрагические диатезы и другие заболевания, сопровождающиеся понижением свертывания крови; беременность; повышенная чувствительность к сулодексиду.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, боли в эпигастральной области. Прочие: кожная сыпь; в месте инъекции - боль, жжение, гематома.

Передозировка

Симптомы: кровоточивость или кровотечение. Лечение: поддержание жизненно важных функций (на фоне отмены препарата).

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное использование с препаратами, влияющими на систему гемостаза (прямые и непрямые антикоагулянты, антиагреганты).

Особые указания

При применении сулодексида следует регулярно контролировать состояние свертывающей системы крови (коагулограмма). Не рекомендуется одновременно применять антикоагулянты (прямые и непрямые) и антиагреганты.

Условия хранения

В сухом месте