Инструкция по применению
Ангиовит Таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пиридоксин+Цианокобаламин+Фолиевая кислота
Количество в упаковке: 60



Описание

Таблетки белого цвета, круглые, двояковыпуклые, на поперечном разрезе видны два слоя.

Действующее вещество

Пиридоксин+Цианокобаламин+Фолиевая кислота

Состав

1 таблетка содержит:Активные вещества:фолиевой кислоты — 5 мг,пиридоксина гидрохлорида — 4 мг,цианокобаламина — 0,006 мг,Вспомогательные вещества:тальк, кальция стеарат, крахмал картофельный «Экстра»,Состав оболочки: сахар, воск пчелиный, магния карбонат основной, масло подсолнечное рафинированное, мука пшеничная, целлюлоза водорастворимая, желатин пищевой, титана диоксид.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В комплексной терапии ишемической болезни сердца, недостаточности мозгового кровообращения атеросклеротического генеза, диабетической ангиопатии у взрослых. Гипергомоцистеинемия.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1 таблетке в день вне зависимости от приема пищи. Курс лечения 20-30 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Фолиевая кислота. Снижает эффект фенитоина (требуется увеличение его дозы). Анальгетики (длительная терапия), противосудорожные препараты (в т.ч. фенитоин и карбамазепин), эстрогены, пероральные контрацептивы увеличивают потребность в фолиевой кислоте.Антациды (в т.ч. препараты алюминия и магния), колестирамин, сульфонамины (в т.ч. сульфасалазин) снижают абсорбцию фолиевой кислоты. Метотрексат, пириметамин, триамтерен, триметоприм ингибируют дигидрофолатредуктазу и снижают эффект фолиевой кислоты.Пиридоксина гидрохлорид. Усиливает действие диуретиков, ослабляет активность леводопы. Изоникотина гидразид, пеницилламин, циклосерин и эстрогенсодержащие пероральные контрацептивы ослабляют эффект пиридоксина.Хорошо сочетается с сердечными гликозидами (пиридоксин способствует повышению синтеза сократительных белков в миокарде), с глутаминовой кислотой и аспаркамом (повышается устойчивость к гипоксии).Цианокобаламин. Аминогликозиды, салицилаты, противоэпилептические препараты, колхицин, препараты калия снижают абсорбцию цианокобаламина. Усиливают риск развития аллергических реакций на фоне тиамина.Нельзя сочетать с препаратами, повышающими свертываемость крови.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 градусов.