Инструкция по применению
Анкзилера Капсулы 50 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: InPharmasci
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Этифоксин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 0,05



Описание

Твердые желатиновые капсулы с белым непрозрачным корпусом и голубой непрозрачной крышечкой. Содержимое капсулы - почти белый порошок.

Действующее вещество

Этифоксин

Состав

Препарат Анкзилера**®** **содержит** Действующим веществом является этифоксин. 1 капсула содержит 50 мг этифоксина гидрохлорида. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: фумаровая кислота, лактозы моногидрат, стеариновая кислота. Капсула Крышечка капсулы: краситель синий патентованный V (E131), краситель азорубин (E122), титана диоксид (E171), вода, желатин. Корпус капсулы: титана диоксид (E171), вода, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат Анкзилера® показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения тревоги и связанных с ней психосоматических расстройств.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. **Рекомендуемая доза:** Доза препарата определяется врачом, индивидуально, в зависимости от состояния больного. Обычно назначается по 1 капсуле 3 раза в день или по 2 капсулы 2 раза в день (150-200 мг/сут). **Путь или способ введения** Внутрь, с небольшим количеством воды. **Продолжительность терапии** Продолжительность лечения - от нескольких дней до 4-6 недель, в зависимости от состояния больного. **Если Вы забыли принять препарат Анкзилера®** В случае пропуска приема препарата не удваивайте дозу при следующем приеме. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Анкзилера®:

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Не принимайте препарат в период беременности и грудного вскармливания.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам Анкзилера® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. **Прекратите прием препарата Анкзилера® и немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих признаков серьезных нежелательных реакций, которые наблюдались: **Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): **Очень редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000): **Неизвестно** (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): **Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Анкзилера®** **Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): **Очень редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000): **Неизвестно** (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): **Сообщение о нежелательных реакциях** Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Анкзилера® больше, чем следовало В случае передозировки симптомами могут быть вялость, чрезмерная сонливость. В этом случае немедленно свяжитесь с врачом или обратитесь в отделение экстренной помощи ближайшей больницы.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие лекарственные препараты. Препарат Анкзилера® потенцирует действие препаратов, угнетающих центральную нервную систему, таких как опиоидные анальгетики, барбитураты, снотворные препараты, бензодиазепины, Н1 -антигистаминные средства, нейролептики, антидепрессанты с седативным эффектом, антигипертензивные средства центрального действия, баклофен, талидомид.

Особые указания

Перед приемом препарата Анкзилера® проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если у Вас есть риск развития проблем с печенью, Ваш лечащий врач проведет лабораторные исследования для проверки функции печени перед началом приема препарата Анкзилера® и примерно через месяц после начала лечения. Вам следует прекратить прием препарата Анкзилера®, ни в коем случае не возобновлять прием и немедленно обратиться за медицинской помощью, если во время приема препарата у Вас возникнет любая из следующих реакций: Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у Вас возникают межменструальные кровотечения (метроррагия) и Вы принимаете оральные контрацептивы во время лечения препаратом Анкзилера®. Вам следует проявлять осторожность, если Вы принимаете препараты, угнетающие центральную нервную систему, из-за риска возможного взаимного усиления действия последних (см. раздел «Другие препараты и препарат Анкзилера®»). **Дети и подростки** Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет. **Препарат Анкзилера® с пищей, напитками и алкоголем** Не принимайте препарат совместно с алкогольными напитками и лекарственными препаратами, содержащими этанол, поскольку он усиливает воздействие алкоголя. **Препарат Анкзилера® содержит лактозы моногидрат** Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. **Препарат Анкзилера® содержит краситель азорубин (Е122)** Азорубин может вызывать аллергические реакции. В связи с риском возникновения сонливости следует во время лечения избегать управления автотранспортом и деятельности, требующей повышенного внимания, например, управления различными механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре не выше 25 °С.