Инструкция по применению
Антацидин Таблетки жевательные 1250 мг 18 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Россия
Производитель: Квадрат-С
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 18

Описание

Антацидин - Биологически активная добавка (БАД) к пище «Антацидин» (от лат. anti - против и acidum - кислота) - продукт, способствующий облегчению чувства дискомфорта в желудке. Плотная трапеза, курение, употребление определенных продуктов (сладости, кофе, томаты, цитрусовые, пряная или острая пища и др.), тяжелый физический труд, прием некоторых лекарственных препаратов - вот далеко не полный список ситуаций, в результате которых человек может ощущать дискомфорт, чувство жжения или тепла в пищеводе, горький или кислый привкус во рту. Скорее всего, нечто подобное хотя бы раз в жизни испытывал каждый. Суточная доза (2 - 4 таблетки) содержит: Кальций 540 - 1080 мг Магний 50 - 100 мг Активные ингредиенты: • Кальция карбонат и магния карбонат при попадании в желудок вступают в реакцию с находящейся там соляной кислотой, при забросе которой в пищевод человек чувствует неприятные ощущения. В результате нейтрализации соляной кислоты образуется вода и растворимые минеральные соли, причем этот процесс происходит с достаточно высокой скоростью, что способствует быстрому избавлению от таких проявлений дискомфорта, как чувство переполнения в подложечной области, тошнота, отрыжка кислым. • Ионы магния помогают усилить образование слизи в желудке, повышая тем самым устойчивость его слизистой оболочки к агрессивному воздействию соляной кислоты. Многие средства для устранения дискомфорта в желудке, в состав которых входят соли кальция, способны вызывать запоры. «Антацидин», кроме карбоната кальция, содержит карбонат магния - два компонента, которые подобраны таким образом, что при приеме в рекомендованных дозах они не вызывают ни усиления запоров, ни их возникновения. Специальные особенности: Не содержит сахара

Состав

Кальция карбонат, сорбит (подсластитель), магния карбонат, тальк (агент антислеживающий), крахмал картофельный, кальция стеарат (агент антислеживающий), аспартам (подсластитель), ароматизатор натуральный «Мята» (ароматические вещества, пропиленгликоль или ароматические вещества, триацетин). Содержит подсластители сорбит и аспартам. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Содержит источник фенилаланина.

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника кальция и магния.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 - 2 таблетки 2 раза в день непосредственно после еды, Таблетки следует разжевать или держать во рту до полного растворения. Продолжительность приема - 1-2 месяца. При необходимости прием можно повторить. Во избежание возникновения побочных эффектов в виде запоров «Антацидин» следует принимать, не превышая указанную длительность приема и дозировку (не более 4 таблеток в день).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, гиперкальциемия, тяжелая почечная недостаточность, фенилкетонурия. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.