Инструкция по применению
Анти-Ангин Формула Спрей 100 доз 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Нидерланды
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хлоргексидин + тетракаин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,24 мг + 0,12 мг/доза
Срок годности: 24 месяца

Описание

Дозированный спрей для местного применения с антисептическим и местноанестезирующим действием. Используется при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.

Действующее вещество

Хлоргексидин + тетракаин

Состав

Одна доза содержит хлоргексидина биглюконат 0,24 мг и тетракаина гидрохлорид 0,12 мг. Вспомогательные вещества: глицерол 85%, этанол 96%, аспартам, ароматизатор мятный, пропилпарагидроксибензоат, лимонная кислота безводная и вода очищенная.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Тетракаин всасывается через слизистые оболочки, связывается с белками плазмы и гидролизуется холинэстеразой с образованием соединений пара-аминобензойной кислоты; выводится почками и с желчью. Хлоргексидин практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта и выводится преимущественно через кишечник.

Показания

Профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки, вызванных чувствительными к хлоргексидину микроорганизмами: фарингита, тонзиллита, начальной стадии ангины, стоматита, гингивита, пародонтоза, а также состояний после тонзиллэктомии или удаления зуба.

Способ применения и дозы

Применяют местно. Распыляют на слизистую оболочку полости рта и горла при задержке дыхания. * Взрослым и детям старше 15 лет — по 1–2 впрыскивания за один прием до 6 раз в сутки. * Детям от 10 до 15 лет — по 1–2 впрыскивания за один прием до 3 раз в сутки. Продолжительность лечения — не более 5 дней без консультации врача.

Противопоказания

* Повышенная чувствительность к компонентам препарата. * Повреждение или воспаление слизистых оболочек в высоковаскуляризированных областях. * Фенилкетонурия. * Детский возраст до 10 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности и грудного вскармливания препарат применяют только после консультации врача, когда ожидаемая польза превышает возможный риск.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции и кратковременное ощущение жжения слизистой оболочки полости рта.

Передозировка

При передозировке возможны головокружение, слабость, цианоз, возбуждение, тревога, тремор, нарушение дыхания, тошнота и рвота. Необходимо прекратить применение и обратиться за медицинской помощью; лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Сахароза, полисорбат 80 и нерастворимые соли магния, цинка и кальция уменьшают действие хлоргексидина. Тетракаин снижает антибактериальную активность сульфаниламидов; сосудосуживающие средства удлиняют его эффект и уменьшают токсичность. Ингибиторы холинэстеразы повышают токсичность тетракаина, антикоагулянты повышают риск кровотечений, ингибиторы МАО увеличивают риск снижения артериального давления, бета-адреноблокаторы замедляют метаболизм тетракаина.

Особые указания

Не вдыхать при распылении и не допускать попадания в глаза. Препарат содержит этанол и аспартам. Не применять более 5 дней без консультации врача. При сохранении симптомов или повышении температуры следует обратиться к врачу.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.