Инструкция по применению
Антигриппин-Анви Капсулы 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Фармпроект
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ацетилсалициловая кислота+Аскорбиновая кислота
Количество в упаковке: 20
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Ацетилсалициловая кислота+Аскорбиновая кислота

Состав

Действующее вещество: 1 капсула зеленого цвета содержит: Ацетилсалициловая кислота 250 мг.Акорбиновая кислота 300 мг.Рутин 20 мг. 1 капсула белого цвета содержит: Метамизол 250 мг.Дифенгидрамин 20 мг.Кальция глюконат 100 мг. Концентрация действующего вещества (мг): 570 мг и 370 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Антигриппин-АНВИ не предоставлены.

Показания

Симптоматическое лечение гриппа , ОРВИ , простудных заболеваний у взрослых и подростков старше 15 лет.

Способ применения и дозы

Препарат назначают взрослым и подросткам старше 15 лет по 2 капсулы на прием: 1 зеленая капсула и 1 белая капсула.Длительность приема составляет 3-5 дней до исчезновения симптомов заболевания.Капсулы принимают внутрь 2-3 раза/сут после еды, запивая водой.Пациент должен быть предупрежден, что при отсутствии улучшения самочувствия прием препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Противопоказания

Склонность к кровотечениям.Угнетение кроветворения (агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения).Геморрагические диатезы (гемофилия, болезнь Виллебранда, телеангиэктазия, гипопротромбинемия, тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура).Дефицит витамина К .Бронхиальная астма и заболевания, сопровождающиеся бронхоспазмом.Тяжелые нарушения функции печени.Портальная гипертензия.Тяжелые нарушения функции почек.Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (в т.ч. при наследственной гемолитической анемии, обусловленной дефицитом этого фермента).Расслаивающаяся аневризма аорты. Гиперкальциемия (концентрация ионов кальция не должна превышать 12 мг% или 6 мэкв/л).Гиперкальциурия.Нефролитиаз (кальциевый).Саркоидоз.Гликозидная интоксикация (риск возникновения аритмии).Беременность.Лактация (грудное вскармливание).Детский и подростковый возраст до 15 лет.Повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью назначают препарат при: Гиперурикемии.Уратном нефролитиазе.Подагре.Язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в анамнезе).Декомпенсированной сердечной недостаточности .

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности. При необходимости назначения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание на период применения препарата.Ацетилсалициловая кислота обладает тератогенным эффектом: при применении в I триместре беременности приводит к развитию расщепления верхнего неба; в III триместре – к преждевременному закрытию артериального протока у плода, что вызывает гиперплазию легочных сосудов и гипертензию в сосудах малого круга кровообращения, и к торможению родовой деятельности (из-за ингибирования синтеза простагландинов).Ацетилсалициловая кислота выделяется с грудным молоком, что повышает риск возникновения кровотечений у ребенка вследствие нарушения функции тромбоцитов.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системыАнорексия , тошнота, рвота , гастралгия, диарея, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, желудочно-кишечные кровотечения, печеночная недостаточность . Со стороны сердечно-сосудистой системыПовышение АД , тахикардия . Аллергические реакцииКожная сыпь, отек Квинке, бронхоспазм (при склонности к бронхоспазму возможно провоцирование приступа). Побочные эффекты, отмечаемые при длительном применении препарата (более 7 дней)Со стороны системы кроветворенияТромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения. Со стороны ЦНСГоловокружение , головная боль, нарушения зрения, шум в ушах, глухота. Со стороны свертывающей системы кровиСнижение агрегации тромбоцитов , гипокоагуляция, геморрагический синдром (в т.ч. носовое кровотечение, кровоточивость десен, пурпура). Аллергические реакцииАнафилактический шок, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла). Со стороны мочевыделительной системыПоражение почек с папиллярным некрозом, нарушения функции почек, олигурия, анурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, окрашивание мочи в красный цвет за счет выделения метаболита. ПрочиеУ подростков - синдром Рейе (гиперпирексия, метаболический ацидоз, нарушения со стороны нервной системы и психики, рвота , нарушения функции печени).

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, боли в желудке, потливость, бледность кожных покровов, тахикардия; при незначительной передозировке - звон в ушах; при выраженной передозировке – сонливость, коллапс, судороги, бронхоспазм, затрудненное дыхание, анурия, кровотечения, прогрессирующий паралич дыхания и респираторный ацидоз (вследствие разобщения окислительного фосфорилирования).Лечение: искусственная рвота, промывание желудка, назначение солевых слабительных, активированного угля; при развитии судорожного синдрома – в/в введение диазепама и барбитуратов; при необходимости - проведение форсированного диуреза, гемодиализа.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении Антигриппин-АНВИ усиливает действие гепарина, непрямых антикоагулянтов, резерпина, стероидных гормонов и гипогликемических средств.При одновременном применении Антигриппин-АНВИ уменьшает эффективность спиронолактона, фуросемида, антигипертензивных и урикозурических средств.Антигриппин-АНВИ усиливает побочные реакции ГКС, производных сульфонилмочевины, метотрексата, ненаркотических анальгетиков и НПВС.При одновременном применении препарата Антигриппин-АНВИ с барбитуратами, противоэпилептическими средствами, зидовудином, рифампицином и этанолсодержащими препаратами увеличивается риск гепатотоксического действия. Указанных комбинаций следует избегать.Аскорбиновая кислота улучшает всасывание в кишечнике препаратов железа.Трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы и аллопуринол нарушают метаболизм метамизола в печени и повышают его токсичность.Одновременное применение метамизола натрия с циклоспорином снижает уровень последнего в плазме крови.Седативные средства и транквилизаторы усиливают анальгезирующее действие метамизола натрия.При одновременном применении с метамизолом натрия тиамазол и мелфалан повышают риск развития лейкопении.Метамизол натрия усиливает эффекты алкогольсодержащих напитков.

Особые указания

При продолжительном применении препарата необходим контроль картины периферической крови и лабораторных показателей функционального состояния печени.Поскольку ацетилсалициловая кислота оказывает антиагрегантное действие, пациент, если ему предстоит хирургическое вмешательство, должен заранее предупредить врача о приеме препарата.Ацетилсалициловая кислота в низких дозах уменьшает выведение мочевой кислоты, что может в ряде случаев спровоцировать приступ подагры.Назначение аскорбиновой кислоты пациентам с быстро пролиферирующими и интенсивно метастазирующими опухолями может усугубить течение процесса.У больных с бронхиальной астмой и поллинозами при приеме препарата возможно развитие реакций повышенной чувствительности.В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на синтез кортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией почек и АД.Не рекомендуется назначать препарат с антикоагулянтами, ГКС, тиклопидином, урикозурическими и антигипертензивными средствами.Аскорбиновая кислота может искажать результаты различных лабораторных тестов (определение содержания глюкозы, билирубина и активности печеночных трансаминаз, ЛДГ в плазме крови).Рентгеноконтрастные вещества, коллоидные кровезаменители и пенициллин не должны применяться во время применения метамизола натрия.На фоне применения препарата пациентам следует избегать употребления алкоголя из-за повышенного риска развития желудочно-кишечного кровотечения.Использование в педиатрииПрепарат не назначают в качестве жаропонижающего средства детям в возрасте до 15 лет с острыми респираторными вирусными заболеваниями из-за опасности развития синдрома Рейе (энцефалопатия и острая жировая дистрофия печени с острым развитием печеночной недостаточности).Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период применения препарата следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте