Инструкция по применению
Антистакс капсулы 180мг N20

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Швейцария
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Винограда красных листьев экстракт сухой
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 180 мг
Срок годности: 36



Действующее вещество

Винограда красных листьев экстракт сухой

Состав

Сухой экстракт красных листьев винограда (4-6:1) 180 мг;Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный - 9.35 мг, декстроза жидкая (декстроза, олиго- и полисахариды) - 38.25 мг, крахмал кукурузный - 8.4 мг, магния стеарат - 2.6 мг, тальк - 8.4 мг.;Состав оболочки капсулы: желатин - 63.004 мг, натрия лаурилсульфат - 0.152 мг, титана диоксид (E171) - 0.76 мг, краситель железа оксид красный (E172) - 0.912 мг, краситель железа оксид желтый (E172) - 0.152 мг, вода очищенная - 11.02 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (EMEA HMPWG 11/99) при проведении клинических испытаний препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания

— профилактика и симптоматическое лечение хронической венозной недостаточности (в сочетании с варикозным расширением вен), включая отеки нижних конечностей, ощущения тяжести и усталости в нижних конечностях, чувство напряжения, парестезии и боль.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь по 2 капс. 1 раз/сут до еды, утром. При необходимости доза может быть увеличена до 4 капс./сут.;Капсулы следует проглатывать целиком, запивая водой. Курс лечения составляет 12 недель. Возможно применение повторного курса по рекомендации врача.;С целью профилактики обострений препарат принимают по 2 капс. 1 раз/сут в течение 4 недель. Профилактически препарат рекомендуется применять 2 раза в год.

Противопоказания

— возраст до 18 лет; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Антистакс; не рекомендуется принимать при беременности и в период грудного вскармливания, т.к. исследования по безопасности применения препарата у беременных и у женщин, кормящих грудью, не проводились.

Побочные действия

Со стороны кожи и подкожных тканей, аллергические реакции: редко (менее 1%) - генерализованная зудящая кожная сыпь; очень редко (менее 0.1%) - крапивница и другие реакции гиперчувствительности.;Со стороны ЖКТ: редко (менее 1%) - дискомфорт в желудке, тошнота.

Передозировка

Сообщалось о единичных случаях передозировки препаратом, при этом специфических симптомов, требующих лечение, не выявлено. Не зафиксировано ни одного серьезного нежелательного явления, связанного с лечением препаратом Антистакс;.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Антистакс; не установлено.

Особые указания

В случае возникновения, особенно в одной ноге, внезапного отека, покраснения кожи, чувство напряжения, жжения и боли необходимо немедленно обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть следствием развития тромбофлебита. После консультации с врачом можно возобновить применение препарата.;В случае недостаточного или неудовлетворительного терапевтического эффекта в течение 6 недель лечения, следует проконсультироваться с врачом в отношении других возможных причин периферических отеков.;В 1 капсуле содержится 7.5 мг глюкозы (0.00063 ХЕ). В максимальной суточной дозе (4 капсулы) содержится 30 мг глюкозы (0.0025 ХЕ).; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами; Исследования по влиянию препарата на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не проводились. До настоящего времени не было выявлено случаев влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

В сухом месте