Инструкция по применению
Анвифен Капсулы 250 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Сотекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Аминофенилмасляная кислота
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Аминофенилмасляная кислота

Состав

Аминофенилмасляной кислоты гидрохлорид 250 мг;Вспомогательные вещества: гипролоза - 2.0 мг, кремния диоксид коллоидный - 8.0 мг, лактоза - 86.5 мг, магния стеарат - 3.5 мг.;Состав оболочки капсулы: желатин, краситель азорубин (Е122), краситель бриллиантовый голубой (Е133), титана диоксид (Е171), вода.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание и распределение;Абсорбция высокая, хорошо проникает во все ткани организма и через ГЭБ (в ткани мозга проникает около 0.1% введенной дозы препарата, причем у лиц молодого и пожилого возраста в значительно большей степени). Равномерно распределяется в печени и почках.;Метаболизм и выведение; Метаболизируется в печени - 80-95%, метаболиты фармакологически не активны. Не кумулирует. Через 3 ч начинает выводиться почками, при этом концентрация в ткани мозга не снижается и обнаруживается еще в течение 6 ч. Около 5% выводится почками в неизмененном виде, частично с желчью.

Показания

— астенические и тревожно-невротические состояния; — заикание, тики и энурез у детей; — бессонница и ночная тревога у пациентов пожилого возраста; — болезнь Меньера, головокружения, связанные с дисфункциями вестибулярного анализатора различного генеза; — профилактика укачивания при кинетозах; — в составе комплексной терапии алкогольного абстинентного синдрома для купирования психопатологических и соматовегетативных расстройств.

Способ применения и дозы

Внутрь после еды 2-3-недельными курсами.;Взрослым и детям с 14 лет по 250-500 мг 3 раза/сут (максимальная суточная доза 2500 мг). Детям с 3 до 8 лет по 50-100 мг 3 раза/сут; от 8 до 14 лет - по 250 мг 3 раза/сут.;Однократная максимальная доза у взрослых и детей с 14 лет составляет 750 мг, у пациентов старше 60 лет - 500 мг, у детей до 8 лет - 150 мг, от 8 до 14 лет - 250 мг.;При алкогольном абстинентном синдроме - по 250-500 мг 3 раза/день и на ночь - 750 мг, с постепенным понижением суточной дозы до обычной для взрослых.;Для лечения головокружения при дисфункциях вестибулярного аппарата и болезни Меньера - 250 мг 3 раза/сут на протяжении 14 дней.;Для профилактики укачивания - 250-500 мг однократно за 1 ч до предполагаемого начала качки или при появлении первых симптомов морской болезни. Противоукачивающее действие препарата Анвифен; усиливается при увеличении дозы препарата. При наступлении выраженных проявлений морской болезни (рвота и т.д.) назначение препарата Анвифен; малоэффективно даже в дозах 750-1000 мг.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата; — беременность; — грудное вскармливание; — детский возраст до 3 лет.;С осторожностью следует применять препарат при эрозивно-язвенном поражении ЖКТ, печеночной недостаточности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно: сонливость, тошнота, усиление раздражительности, возбуждение, тревога, головокружение, головная боль (при первых приемах), аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: выраженная сонливость, тошнота, рвота, жировая дистрофия печени (прием более 7 г), эозинофилия, снижение АД, нарушение функции почек.;Лечение: промывание желудка, прием активированного угля и проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Удлиняет и усиливает действие снотворных препаратов, наркотических анальгетиков, нейролептиков, противопаркинсонических и противоэпилептических средств.

Особые указания

При длительном применении необходимо периодически контролировать показатели функции печени и периферической крови.;Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Необходимо воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания.

Условия хранения

В сухом месте