Инструкция по применению
АнвиМакс Порошок для приготовления Раствора для приема внутрь со вкусом и ароматом клюквы 5 г пакетики 12 шт

Характеристики



Форма выпуска: Пакетик (саше)
Страна: Россия
Производитель: Сотекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Парацетамол+Римантадин+Аскорбиновая кислота+Лоратадин+Рутозид+Кальция карбонат
Количество в упаковке: 12
Дозировка действующего вещества: 5 г

Действующее вещество

Парацетамол+Римантадин+Аскорбиновая кислота+Лоратадин+Рутозид+Кальция карбонат

Состав

В 1 пакете: Вспомогательные вещества:

Форма выпуска

Пакетик (саше)

Показания

Этиотропное лечение гриппа типа А. Симптоматическое лечение "простудных" заболеваний, гриппа и ОРВИ, сопровождающихся повышением температуры, болями в мышцах, головной болью, ознобом у взрослых.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды. Капсулы следует запивать водой. Порошок (содержимое 1 пакетика) необходимо растворить в 1/2 стакана теплой кипяченой воды и размешать. Полученный раствор следует употребить сразу после приготовления. Взрослым назначают по 1 капсуле П синего цвета и 1 капсуле Р красного цвета (разовая доза) или по 1 пакетику порошка 2-3 раза/сут. Препарат следует принимать в течение 3-5 дней (не более 5 дней) до исчезновения симптомов болезни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам, входящим в состав препарата, Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения, желудочно-кишечные кровотечения, Гемофилия, Геморрагический диатез, Гипопротромбинемия, Портальная гипертензия, Авитаминоз К, Почечная недостаточность, Заболевания щитовидной железы, Острые заболевания почек, печени (острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит, острый гепатит), либо обострение хронических заболеваний данных органов, Хронический алкоголизм, Гиперкальциемия, выраженная гиперкальциурия, Нефроуролитиаз, Саркоидоз, Одновременный прием сердечных гликозидов (риск возникновения аритмий), Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, Фенилкетонурия (для порошка), Беременность, Период грудного вскармливания, Детский и подростковый возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Со стороны нервной системы: Со стороны пищеварительной системы: Со стороны мочевыделительной системы: Со стороны системы кроветворения: Со стороны эндокринной системы: Аллергические реакции: Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, пациенту следует немедленно сообщить об этом врачу.

Особые указания

Со стороны нервной системы: Со стороны пищеварительной системы: Со стороны мочевыделительной системы: Со стороны системы кроветворения: Со стороны эндокринной системы: Аллергические реакции: Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, пациенту следует немедленно сообщить об этом врачу.