Инструкция по применению
АнвиМакс Порошок для приготовления Раствора для приема внутрь со вкусом и ароматом клюквы 5 г пакетики 3 шт

Характеристики



Форма выпуска: Пакетик (саше)
Страна: Россия
Производитель: Сотекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Парацетамол+Римантадин+Аскорбиновая кислота+Лоратадин+Рутозид+Кальция карбонат
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 5 г

Действующее вещество

Парацетамол+Римантадин+Аскорбиновая кислота+Лоратадин+Рутозид+Кальция карбонат

Состав

В 1 пакете: парацетамол 360 мг . аскорбиновая кислота 300 мг . кальция глюконата моногидрат 100 мг . римантадина гидрохлорид 50 мг . рутозид (в форме тригидрата) 20 мг . лоратадин 3 мг. Вспомогательные вещества: аспартам - 30 мг, гипромеллоза - 10 мг, кремния диоксид коллоидный - 20 мг, лактозы моногидрат - 4086 мг, ароматизатор (клюквенный) - 21 мг.

Форма выпуска

Пакетик (саше)

Показания

Этиотропное лечение гриппа типа А . симптоматическое лечение "простудных" заболеваний, гриппа и ОРВИ, сопровождающихся повышением температуры, болями в мышцах, головной болью, ознобом у взрослых.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды. Капсулы следует запивать водой. Порошок (содержимое 1 пакетика) необходимо растворить в 1/2 стакана теплой кипяченой воды и размешать. Полученный раствор следует употребить сразу после приготовления. Взрослым назначают по 1 капсуле П синего цвета и 1 капсуле Р красного цвета (разовая доза) или по 1 пакетику порошка 2-3 раза/сут. Препарат следует принимать в течение 3-5 дней (не более 5 дней) до исчезновения симптомов болезни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам, входящим в состав препарата . эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения . — желудочно-кишечные кровотечения . гемофилия . геморрагический диатез . гипопротромбинемия . портальная гипертензия . авитаминоз К . почечная недостаточность . заболевания щитовидной железы . острые заболевания почек, печени (острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит, острый гепатит), либо обострение хронических заболеваний данных органов . хронический алкоголизм . гиперкальциемия, выраженная гиперкальциурия . нефроуролитиаз . саркоидоз . одновременный прием сердечных гликозидов (риск возникновения аритмий) . непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция . фенилкетонурия (для порошка) . беременность . период грудного вскармливания . детский и подростковый возраст до 18 лет .

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Со стороны нервной системы: повышенная возбудимость, сонливость, тремор, гиперкинезия, головокружение, головная боль, "приливы" крови к лицу. Со стороны пищеварительной системы: поражение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, диспепсия, сухость слизистой оболочки во рту, отсутствие аппетита, метеоризм, диарея. Со стороны мочевыделительной системы: умеренная поллакиурия. Со стороны системы кроветворения: изменения показателей крови (необходим контроль). Со стороны эндокринной системы: угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия). Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, пациенту следует немедленно сообщить об этом врачу.

Особые указания

Со стороны нервной системы: повышенная возбудимость, сонливость, тремор, гиперкинезия, головокружение, головная боль, "приливы" крови к лицу. Со стороны пищеварительной системы: поражение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, диспепсия, сухость слизистой оболочки во рту, отсутствие аппетита, метеоризм, диарея. Со стороны мочевыделительной системы: умеренная поллакиурия. Со стороны системы кроветворения: изменения показателей крови (необходим контроль). Со стороны эндокринной системы: угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия). Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, пациенту следует немедленно сообщить об этом врачу.