Инструкция по применению
АнвиМакс Таблетки шипучие со вкусом и ароматом клюквы 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармвилар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Парацетамол+Римантадин+Аскорбиновая кислота+Лоратадин+Рутозид+Кальция карбонат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 360 мг +300 мг +100 мг +50 мг +20 мг +3 мг

Описание

АнвиМакс - таблетки шипучие от светло- розового до темно-розового цвета, с более светлыми и темными вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с шероховатой поверхностью, с фаской, с характерным запахом. допускаются вкрапления зеленовато-желтого цвета. гигроскопичны.

Действующее вещество

Парацетамол+Римантадин+Аскорбиновая кислота+Лоратадин+Рутозид+Кальция карбонат

Состав

Парацетамол, аскорбиновая кислота, кальция глюконата моногидрат, римантадина гидрохлорид, рутозид, лоратадин.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Лечение гриппа типа А. симптоматическое лечение простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, сопровождающихся повышением температуры, болями в мышцах, головной болью, ознобом.

Способ применения и дозы

Препарат следует принимать внутрь после еды. Таблетку шипучую следует растворить в 1/2 стакане кипяченой горячей воды и размешать. Раствор необходимо употребить сразу после приготовления. Препарат в форме таблеток шипучих назначают по 1 табетки 2-3 раза в сутки до исчезновения симптомов заболевания. Продолжительность курса лечения составляет 3-5 дней (не более 5 дней). Если в течение 3 дней после начала применениянрепарата улучшения самочувствия не наблюдается, пациент должен прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Противопоказания

Абсолютные: - геморрагический диатез, - почечная недостаточность, - нефроуролитиаз, - острые заболевания печени и/или почек (острый гепатит, острый пиелонефрит, острый гломерулонефрит), - обострение хронических заболеваний печени и/или почек, - желудочно-кишечные кровотечения, - портальная гипертензия, - гемофилия, - саркоидоз, - обострение эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, - авитаминоз К, - выраженная гиперкальциурия, - гиперкальциемия, - гипопротромбинемия, - хронический алкоголизм, - фенилкетонурия (для АнвиМакса в форме порошка), - заболевания щитовидной железы, - дефицит лактазы, - синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, - одновременное применение сердечных гликозидов, - детский и подростковый возраст младше 18 лет, - период беременности и лактации, - гиперчувствительность к компонентам препарата (одному или нескольким). Относительные (АнвиМакс применяют с осторожностью): - сахарный диабет, - мочекаменная болезнь, - электролитные нарушения, - кальциевый нефроуролитиаз (в анамнезе), - диарея, - гиперкальциурия, - гипероксалурия, - дегидратация, - сидеробластная анемия, - гемохроматоз, - талассемия, - дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, - церебральный атеросклероз, - эпилепсия. Пожилым пациентам с артериальной гипертензией применять АнвиМакс следует с осторожностью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

пищеварительная система: - диспепсия, - отсутствие аппетита, - поражение слизистой двенадцатиперстной кишки и желудка, - сухость слизистой оболочки ротовой полости, - диарея, - метеоризм, центральная нервная система: - тремор, - головная боль, - повышенная возбудимость, - приливы крови к лицу, - головокружение, - сонливость, - гиперкинезия, эндокринная система: - глюкозурия, гипергликемия, система кроветворения: - изменение показателей крови, мочевыделительная система: - умеренная поллакиурия, аллергические реакции: - зуд, - сыпь на коже, - крапивница. При усугублении указанных побочных действии или появлении любых других нежелательных реакций следует сообщить об этом лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении парацетамола с урикозурическими препаратами снижается их эффективность. Высокие дозы парацетамола повышают эффект антикоагулянтов. Метоклопрамид может увеличивать скорость всасывания парацетамола. Барбитураты (при длительном применении) уменьшают эффективность парацетамола. Этанол, гепатотоксичные препараты, рифампицин, трициклические антидепрессанты, фенитоин, фенилбутазон и барбитураты повышают риск развития тяжелых интоксикаций даже при незначительной передозировке парацетамола. Ингибиторы микросомального окисления уменьшают вероятность гепатотоксического действия. Аскорбиновая кислота улучшает всасывание препаратов железа в кишечнике, повышает концентрацию бензилпенициллина в крови, при одновременном применении с сульфаниламидами короткого действия и салицилатами увеличивает вероятность развития кристаллурии, повышает выведение препаратов, имеющих щелочную реакцию, и замедляет выведение кислот, при одновременном приеме с дефероксамином может повышать выведение железа, уменьшает хронотропное действие изопреналина, снижает концентрацию пероральных контрацептивов в крови, повышает клиренс этанола (он, в свою очередь, уменьшает концентрацию аскорбиновой кислоты в организме), уменьшает канальцевую реабсорбцию трициклических антидепрессантов и амфетамина, снижает терапевтический эффект нейролептиков, являющихся производными фенотиазина. При одновременном применении с примидоном и барбитуратами повышается ее выведение с мочой. Римантадин при совместном приеме с кофеином усиливает его возбуждающий эффект. Концентрация лоратадина в крови повышается при одновременном применении с ингибиторами CYP3A4 и CYP2D6

Условия хранения

В сухом прохладном месте. Беречь от детей. Не подвергать воздействию прямого солнечного света. При комнатной температуре