**Инструкция по применению**
**А-Пар Аэрозоль 125 г**

### Характеристики

Форма выпуска: Аэрозоль
Страна: Франция
Производитель: СКАТ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эсдепаллетрин+Пиперонилбутоксид
Количество в упаковке: 1




### Описание

Прозрачный раствор от светло-желтого до темно-желтого цвета.

### Действующее вещество

Эсдепаллетрин+Пиперонилбутоксид

### Состав

Состав (на баллон 152 г) Действующие вещества: Эсбиол (эсдепаллетрин) 1,008 г (0,663%) Пиперонилбутоксид 8,064 г (5,305%) Вспомогательные вещества: 96% этанол, макроглицериды, диэтиленгликоля моноэтиловый эфир, пропеллеит HFA134a

### Форма выпуска

Аэрозоль

### Показания

Чесотка.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Предпочтительно начать лечение вечером (после 18-19 часов), чтобы препарат действовал всю ночь. Перед употреблением необходимо встряхнуть баллон. Путем распыления препарат тщательно наносят на поверхность тела (кроме кожи головы и лица) на расстоянии 20-30 см от поверхности кожи в следующей последовательности - сначала на туловище, потом на конечности (обработанные участки начинают лосниться). Особенно тщательно препарат наносят между пальцами рук, ног, в области подмышек, на все сгибы и пораженные участки и оставляют на коже на 12 часов. Через 12 часов необходимо вымыться с мылом и вытереться. Как правило, однократного применения Спрегаля достаточно, следует иметь в виду, что даже в случае эффективно проведенного лечения, зуд и другие симптомы могут наблюдаться еще 8-10 дней. Если по истечении этого срока симптомы сохраняются, можно нанести препарат повторно. При лечении детей и новорожденных во время распыления препарата необходимо закрыть им нос и рот салфеткой, в случае смены пеленок необходимо заново обработать всю зону ягодиц. При локализации расчесов на лице их обрабатывают ватным тампоном, смоченным Спрегалем.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость, бронхиальная астма, обструктивный бронхит, период лактации на время лечения.

**Побочные действия**

Местные реакции: ощущение легкого жжения, которое обычно быстро проходит. Аллергические реакции.

**Передозировка**

Не известна.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Не известно.

**Особые указания**

Препарат распылять в хорошо проветриваемом помещении. - Во избежание вторичного заражения необходимо продезинфицировать постель и одежду. - Одного баллончика препарата достаточно для лечения 3-4 человек. - Избегать попадания в глаза и на слизистые. В случае попадания в глаза обильно промыть их водой. - Препарат противопоказан при бронхиальной астме, обструктивном бронхите только из-за аэрозольной формы. В этом случае возможно нанесение препарата на кожу ватным тампоном, смоченным Спрегалем.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.