Инструкция по применению
АпиЛак Таблетки подъязычные 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Латвия
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Маточное молочко
Количество в упаковке: 50



Описание

Биостимулирующее средство природного происхождения.

Действующее вещество

Маточное молочко

Состав

1 таблетка содержит: • пчелиное маточное молочко лиофилизированное – 10 мг; вспомогательные вещества: • лактозы моногидрат – 133,1 мг,   • тальк – 4,4 мг, • кальция стеарат – 1,4 мг,   • крахмал картофельный – 1,1 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В период реконвалесценции после перенесенных заболеваний, при нарушении лактации (гипогалактия) в послеродовом периоде. В качестве вспомогательного средства при лечении невротических расстройств и артериальной гипотензии.

Способ применения и дозы

Сублингвально, таблетку держать под языком до полного рассасывания. Взрослым — по 1 таблетке (10 мг) 3 раза в сутки в течение 10–15 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, к продуктам пчеловодства; болезнь Аддисона, возраст до 18 лет (из-за отсутствия достаточного количества клинических данных).

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции, нарушения сна. При появлении побочных реакцияй необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При нарушениях сна следует уменьшить дозу или отменить препарат.

Взаимодействие с другими препаратами

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Апилак Гриндекс отсутствуют.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.