Инструкция по применению
Апизартрон Мазь для наружного применения 20г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Германия
Производитель: Эспарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Яд пчелиный
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Яд пчелиный

Состав

100 г мази содержит:Активное вещество: яд пчелиный 3 мг, метилсалицилат 10 г, аллилизотиоцианат 1 гВспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат - 700 мг, вазелин белый - 6 г, эмульгированный цетостеариловый спирт - 14 мг (натрия цетилстеарилсульфат - 1.4 г, цетостеариловый спирт - 12.6 г), вода - до 100 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

- Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеоартроз, ревматическое поражение мягких тканей).- Артралгии (в т.ч. ревматические заболевания суставов).- Миалгии (в т.ч. связанные с перенапряжением.- Невралгии (в т.ч. невриты, ишиас).- Нарушения периферического кровообращения.- Болевой синдром при мягких поражениях мышц, сухожилий, связок, при ушибах и растяжениях.- Для разогревания мышц до и во время спортивных нагрузок.

Способ применения и дозы

Полоску мази длиной 3–5 см равномерно распределить на коже (толщина слоя примерно 1 мм) до появления покраснения и ощущения тепла (2–3 мин). После этого медленно и интенсивно втереть мазь в кожу. Для усиления лечебного действия рекомендуется поддерживать обработанные места в тепле. Применять 2–3 раза в сутки до исчезновения симптомов (не более 10 дней). После нанесения Апизартрона руки следует тщательно вымыть водой с мылом.

Противопоказания

- Хроническая почечная недостаточность тяжелой степени.- Тяжелые заболевания печени.- Заболевания кожи.- Новообразования.- Угнетение костномозгового кроветворения.- Психические заболевания.- Острый артрит.- Детский возраст до 12 лет.- Повышенная чувствительность к пчелиному яду, салицилатам, изотиацианатам.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение мази Апизартрон при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, зуд в области нанесения мази.

Передозировка

Данные о передозировке препарата Апизартрон не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Апизартрон не описано.

Особые указания

Препарат не следует наносить на поврежденную и раздраженную кожу, а также на участки, пораженные кожным заболеванием.У пациентов с почечной недостаточностью Апизартрон не следует применять на обширных поверхностях кожи в течение длительного времени.Не допускать контакта мази с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами.