Инструкция по применению
Апизартрон Мазь 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Германия
Производитель: Эспарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Мазь от белого до слегка желтоватого цвета, однородной консистенции с запахом метилсалицилата.

Состав

В 100 г препарата содержится: Активные вещества: Яд пчелиный - 3,0 мг, Метилсалицилат - 10,0 г, Аллилизотиоцианат - 1,0 г. Вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат - 0,7 г, белый вазелин - 6,0 г, эмульгированный цетостеариловый спирт - 14,0 г, в составе которого содержится: натрия цетилстеарилсульфат - 1,4 г, цетостеариловый спирт - 12,6 г, вода - до 100 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Заболевания периферической нервной системы, сопровождающиеся ощущением боли: невралгии, невриты, радикулиты, боли в поясничной области (ишиалгии), боли в мышцах (миалгии) и поражения мягких тканей, в т.ч. вызванные травмой, разогрев мышц до, во время и после физических нагрузок и занятиях спортом, повреждения /растяжения сухожилий, сопровождающиеся болью и отеком, заболевания опорно-двигательного аппарата (остеоартроз, ревматическое поражение мягких тканей), дегенеративнодистрофические поражения и боли в суставах.

Способ применения и дозы

Наружно. Полоску мази длиной 3-5 см равномерно распределить на коже (толщина слоя примерно 1 мм) до появления покраснения и ощущения тепла (2-3 минуты). После этого медленно и интенсивно втереть мазь в кожу. Для усиления лечебного действия рекомендуется поддерживать обработанные места в тепле. Применять 2-3 раза в сутки до исчезновения симптомов (не более 10 дней).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к пчелиному яду, салицилатам, изотиоцианату, тяжелая хроническая почечная недостаточность, печеночная недостаточность, заболевания кожи, новообразования, повреждения кожи, острый артрит, инфекционные заболевания, угнетение костномозгового кроветворения, психические заболевания, детский возраст (до 6 лет), беременность и период лактации.

Побочные действия

В редких случаях возможны кожные аллергические реакции, раздражение на месте аппликации.

Взаимодействие с другими препаратами

Метилсалицилат усиливает эффект антикоагулянтов, метотрексата.

Особые указания

При почечной недостаточности не следует допускать длительного применения на больших поверхностях. Не следует наносить на поврежденную и раздраженную кожу. Не допускать контакта мази с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. После нанесения мази руки следует тщательно вымыть с мылом.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.