Инструкция по применению
Аралии Настойка 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Кировская фармацевтическая фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аралии маньчжурской корни
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость коричневато-желтого цвета со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Аралии маньчжурской корни

Состав

Для приготовления настойки используют: Аралии маньчжурской корни - 200 г
Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) 70 % - до получения 1000 мл настойки.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Артериальная гипотония, астенический синдром, физическое и психическое переутомление.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет назначают внутрь по 30-40 капель 2 раза в день (утром и в середине дня) после еды. Курс лечения 15-30 дней. Повторный курс - по рекомендации врача. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, острый период течения инфекционно-воспалительных заболеваний, хронические заболевания печени, повышенная возбудимость, нарушение сна (бессонница), эпилепсия, гиперкинез, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции. Эндокринные нарушения: гипогликемия. Нарушение со стороны нервной системы: нарушение сна (бессонница), эйфория, нервозность, головная боль. Нарушение со стороны сердца: повышение артериального давления. Нарушение со стороны сосудов: тахикардия. Желудочно-кишечные нарушения: диарея. Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции ши они усугубляются, ши Вы заметши любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, носовое кровотечение, гипогликемия. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно потенцирование действия стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.), препарат является физиологическим антагонистом снотворного действия средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных препаратов и т.д.).

Особые указания

Препарат не следует применять во второй половине дня во избежание нарушения сна. Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно. Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых и детей старше 12 лет составляет 0,96 г, в максимальной суточной дозе для взрослых и детей старше 12 лет - 1,93 г. Если слабость, усталость наблюдаются продолжительное время и вызваны неясными причинами, следует обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.