
Инструкция по применению
Аргосульфан Крем для наружного применения 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Польша
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сульфатиазол серебра
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Действующее вещество

Сульфатиазол серебра

Состав

В 1 г содержится: Сульфатиазол серебра 20 мг. Вспомогательные вещества:

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Содержащийся в препарате сульфатиазол серебра, обладает небольшой растворимостью, в результате чего после местного применения концентрация активного вещества в ране длительно поддерживается на одинаковом уровне. Только незначительное количество сульфатиазола серебра оказывается в кровотоке, после чего подвергается в печени ацетилированию. В моче находится в виде неактивных метаболитов и частично в неизмененном виде. Абсорбция сульфатиазола серебра увеличивается после применения на обширных раневых поверхностях.

Показания

ожоги всех степеней любой этиологии (в т.ч. термические, солнечные, химические, электрическим током, лучевые); отморожения; гнойные раны; мелкие бытовые травмы (порезы, ссадины); инфицированные дерматиты, простой контактный дерматит, импетиго, микробная экзема, стрептостафилодермия; пролежни; трофические язвы голени различного генеза (в т.ч. при хронической венозной недостаточности, облитерирующем эндартериите, ангиопатиях при сахарном диабете, роже).

Способ применения и дозы

Препарат применяется местно как открытым методом, так и в виде окклюзионных повязок. После очищения и хирургической обработки с соблюдением условий стерильности на рану наносят препарат слоем толщиной 2-3 мм 2-3 раза/сут. Рана во время лечения должна быть вся покрыта кремом. Если часть раны откроется, необходимо дополнительно нанести крем. Крем наносится до полного заживления раны или до момента пересадки кожи. Если в результате нанесения крема на инфицированные раны появляется экссудат, перед повторным нанесением крема следует промыть рану 0.1% водным раствором хлоргексидина или другим антисептиком. Максимальная суточная доза - 25 г. Максимальная продолжительность лечения - 60 дней.

Противопоказания

врожденная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; недоношенность, грудной возраст до 2 месяцев (в связи с риском развития ядерной желтухи); повышенная чувствительность к сульфатиазолу и другим сульфаниламидам.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Аргосульфана при беременности и в период лактации возможно только в тех случаях, когда поверхность ожога не превышает 20% поверхности тела, и предполагаемая польза для матери больше, чем возможный риск для плода/ребенка.

Побочные действия

Возможно: При длительном применении возможны лейкопения, десквамативный дерматит.

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется применять одновременно с другими местными лекарственными средствами. Фолиевая кислота и ее структурные аналоги могут ослаблять противомикробное действие сульфатиазола.

Особые указания

При печеночной и/или почечной недостаточности следует контролировать концентрацию сульфатиазола в сыворотке крови. С осторожностью следует назначать препарат пациентам, находящимся в состоянии шока, с обширными ожогами из-за невозможности сбора полноценного аллергологического анамнеза. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Препарат не ограничивает психофизической способности, способности управления автотранспортом и обслуживания машинного оборудования в движении.

Условия хранения

Не допускать замерзания