# Инструкция по применению
# Аргосульфан Крем для наружного применения 40 г

## Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Польша
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сульфатиазол серебра
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24




## Действующее вещество

Сульфатиазол серебра

## Состав

В 1 г содержится: Сульфатиазол серебра 20 мгВспомогательные вещества: цетостеариловый спирт (цетиловый спирт 60%, стеариловый спирт 40%) - 84.125 мг, парафин жидкий - 20 мг, вазелин белый - 75.9 мг, глицерол - 53.3 мг, натрия лаурилсульфат - 10 мг, метилгидроксибензоат - 0.66 мг, пропилгидроксибензоат - 0.33 мг, калия дигидрофосфат - 1.178 мг, натрия гидрофосфат - 13.052 мг, вода д/и - до 1 г.

## Форма выпуска

Крем

## Фармакокинетика

Содержащийся в препарате сульфатиазол серебра, обладает небольшой растворимостью, в результате чего после местного применения концентрация активного вещества в ране длительно поддерживается на одинаковом уровне. Только незначительное количество сульфатиазола серебра оказывается в кровотоке, после чего подвергается в печени ацетилированию.В моче находится в виде неактивных метаболитов и частично в неизмененном виде. Абсорбция сульфатиазола серебра увеличивается после применения на обширных раневых поверхностях.

**Показания**

\- ожоги всех степеней любой этиологии (в т.ч. термические, солнечные, химические, электрическим током, лучевые);- отморожения;- гнойные раны;- мелкие бытовые травмы (порезы, ссадины);- инфицированные дерматиты, простой контактный дерматит, импетиго, микробная экзема, стрептостафилодермия;- пролежни;- трофические язвы голени различного генеза (в т.ч. при хронической венозной недостаточности, облитерирующем эндартериите, ангиопатиях при сахарном диабете, роже).

**Способ применения и дозы**

Препарат применяется местно как открытым методом, так и в виде окклюзионных повязок.После очищения и хирургической обработки с соблюдением условий стерильности на рану наносят препарат слоем толщиной 2-3 мм 2-3 раза/сут. Рана во время лечения должна быть вся покрыта кремом. Если часть раны откроется, необходимо дополнительно нанести крем.Крем наносится до полного заживления раны или до момента пересадки кожи.Если в результате нанесения крема на инфицированные раны появляется экссудат, перед повторным нанесением крема следует промыть рану 0.1% водным раствором хлоргексидина или другим антисептиком.Максимальная суточная доза - 25 г. Максимальная продолжительность лечения - 60 дней.

**Противопоказания**

\- врожденная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;- недоношенность, грудной возраст до 2 месяцев (в связи с риском развития ядерной желтухи);- повышенная чувствительность к сульфатиазолу и другим сульфаниламидам.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение Аргосульфана при беременности и в период лактации возможно только в тех случаях, когда поверхность ожога не превышает 20% поверхности тела, и предполагаемая польза для матери больше, чем возможный риск для плода/ребенка.

**Побочные действия**

Возможно: аллергические реакции, местные реакции (жжение, зуд, гиперемия кожи). При длительном применении возможны лейкопения, десквамативный дерматит.

**Передозировка**

Случаи передозировки не зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Не рекомендуется применять одновременно с другими местными лекарственными средствами.Фолиевая кислота и ее структурные аналоги могут ослаблять противомикробное действие сульфатиазола.

**Особые указания**

При печеночной и/или почечной недостаточности следует контролировать концентрацию сульфатиазола в сыворотке крови.С осторожностью следует назначать препарат пациентам, находящимся в состоянии шока, с обширными ожогами из-за невозможности сбора полноценного аллергологического анамнеза.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не ограничивает психофизической способности, способности управления автотранспортом и обслуживания машинного оборудования в движении.

**Условия хранения**

Не допускать замерзания