Инструкция по применению
Артишок таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КАНОНФАРМА ПРОДАКШН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Артишока листьев экстракт
Количество в упаковке: 60



Действующее вещество

Артишока листьев экстракт

Состав

1 таблетка содержит: Активныи# компонент: артишока листьев экстракт сухои# 200,00 мг, вспомогательные вещества: крахмал кукурузныи# прежелатинизированныи# 22,00 мг, магния трисиликат легкии# 12,00 мг, магния стеарат 3,75 мг, просолв (целлюлоза микрокристаллическая (тип 102) 98 %, кремния диоксид коллоидныи# 2 %) 59, 25 мг, тальк 3,00 мг, оболочка: ИсуПолиш®Р коричневыи# 385.04 FSC 50,00 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 12,50 мг, гуммиарабик 1,50 мг, сахароза 22,50 мг, тальк 3,00 мг, титана диоксид 1,00 мг, краситель железа оксид желтыи# 3,50 мг, краситель железа оксид красныи# 3,50 мг, краситель железа оксид черныи# 2,50 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат применяется в комплекснои# терапии дискинезии желчевыводящих путеи# по гипокинетическому типу, хронических некалькулезных холециститов, хронических гепатитов, цирроза печени, хронического нефрита, хроническои# почечнои# недостаточности.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день до еды. Детям старше 6-и лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды. Курс лечения - 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, непроходимость (обтурация) желчевыводящих путеи#, острые заболевания печени, почек, желче и мочевыводящих путеи#, тяжелая гепатоцеллюлярная недостаточность. Дефицит сахаразы изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозогалактозная мальабсорбция. Детскии# возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению и под контролем врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

В случае развития тяжелои# длительнои# диареи или абдоминальнои# боли прием препарата должен быть прекращен и следует обратиться к врачу. При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 2х недель следует сообщить об этом лечащему врачу. Суточная доза препарата содержит 0,040 хлебных единиц (ХЕ).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в упаковке производителя. Хранить в недоступном для детей месте.