Инструкция по применению
Артоксан Гель для наружного применения 1 % 45 г 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Турция
Производитель: World Medicine Ilac San. ve Tic. A.S.
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Теноксикам
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%

Описание

Прозрачный, однородный гель светло-желтого цвета, со слабым запахом спирта.

Действующее вещество

Теноксикам

Состав

На 100 г геля:действующее вещество: теноксикам 1,00 г,вспомогательные вещества: карбомер, этанол 96%, триэтаноламин, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Имеет длительный период полувыведения - 60-75 часов. Легко проходит через гистогематические барьеры, хорошо проникает в синовиальную жидкость. Количество проникающего через кожу теноксикама пропорционально площади, на которую он наносится, а также зависит от суммарной дозы препарата и степени гидратации кожи. Метаболизм осуществляется главным образом путем гидроксилирования. Основная часть метаболитов выводится в виде неактивных метаболитов почками, остальная часть - через кишечник.

Показания

Предназначен для лечения болевого синдрома, связанного с заболеваниями мышц и суставов такими как: ревматоидный артрит, остеоартроз, радикулиты, люмбаго, ишиас, ревматические заболевания мягких тканей (тендовагинит, бурсит, поражения периартикулярных тканей и т.п.), посттравматическое воспаление мягких тканей и суставов (вследствие растяжений, перенапряжений и ушибов).Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияет.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения.Полоску геля длиной примерно 2-5 см (1-2 г геля) наносят на кожу 1-2 раза в сутки и слегка втирают.После нанесения препарата руки необходимо вымыть.Длительность лечения зависит от показаний и эффективности терапии. Через 2 недели применения препарата следует проконсультироваться с врачом о целесообразности продолжения терапии. Препарат не следует применять более 14 дней подряд при поражении мягких тканей или ревматическом заболевании мягких тканей и более 21 дня - в случае боли, обусловленной артритом (если врач не назначил иной схемы лечения). Если в течение 7 дней не отмечена положительная клиническая динамика или состояние ухудшилось, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или вспомогательным компонентам препарата. Существует вероятность перекрестной чувствительности к ацетилсалициловой кислоте, ибупрофену и другим НПВП, полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух, и непереносимости ацетилсалициловой кислоте или других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (в том числе и в анамнезе), тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин), прогрессирующее заболевание почек, тяжелая печеночная недостаточность, установленный диагноз заболеваний свертывающей системы крови, декомпенсированная сердечная недостаточность, терапия послеоперационных болей, нарушение целостности кожных покровов, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет, при нарушении целостности кожных покровов в предполагаемом месте нанесения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Артоксан противопоказан для применения у беременных и кормящих женщин ввиду отсутствия достаточных данных по применению у этой категории больных.

Побочные действия

Частота нежелательных реакций определялась в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения: очень часто (⩾1/10), часто (⩾1/100, Артоксан в виде геля в терапевтических дозах редко вызывает нежелательные реакции.Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна - реакции гиперчувствительности, такие как обострение течения бронхиальной астмы, анафилактические реакции, ангионевротический отек.Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани: нечасто - зуд, эритема, экзантема, сыпь, крапивница, редко - везикулобуллезные поражения, очень редко - тяжелые неблагоприятные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, частота неизвестна - реакции фоточувствительности.В случае появления реакций гиперчувствительности или побочных явлений терапию следует отменить и обратиться к врачу.

Передозировка

Передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь препарат может вызвать нежелательные реакции, характерные для пероральных форм теноксикама.В случае возникновения системных нежелательных реакций рекомендовано промывание желудка и прием адсорбирующих средств (например, активированный уголь). Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Вероятность возникновения взаимодействий незначительна, поскольку системная абсорбция теноксикама при наружном применении низкая.С осторожностью следует применять препарат совместно с другими НПВП.Не следует применять совместно с местными косметическими средствами.

Особые указания

Артоксан следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. После нанесения не следует накладывать окклюзионную повязку. Не следует допускать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.В редких случаях при приеме НПВП могут наблюдаться серьезные кожные реакции, иногда жизнеугрожающие, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Необходимо предупреждать пациентов о признаках и симптомах этих нежелательных реакций, проводить наблюдения на предмет выявления нежелательных реакций со стороны кожных покровов. Риск возникновения подобных реакций является наиболее высоким в начале лечения. Следует прекратить применение препарата Артоксан при первых признаках кожной сыпи, поражения слизистых оболочек или иных признаках гиперчувствительности. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Данные о неблагоприятном воздействии препарата Артоксан, гель для наружного применения, на способность управлять транспортными средствами и механизмами отсутствуют.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С.Хранить в недоступном для детей месте.