Инструкция по применению
Артра 500 мг+500 мг 120 шт., таблетки покрытые пленочной оболочкой

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глюкозамин+Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 120
Дозировка действующего вещества: 500 мг+500 мг
Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Описание

Артра 500 мг + 500 мг, 120 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, является лекарственным препаратом с комплексным действием при заболеваниях суставов. Он содержит глюкозамин и хондроитин, которые помогают повысить эластичность хрящей и улучшить подвижность суставов. Препарат также обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием, снижает риск прогрессирования дегенеративных изменений в суставах. Артра рекомендуется для лечения остеоартроза периферических суставов и позвоночника. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Действующее вещество

Глюкозамин+Хондроитина сульфат

Состав

Активные действующие вещества: * глюкозамина гидрохлорид 500 мг * хондроитин сульфат натрия 500 мг Вспомогательные вещества: * кальция фосфат двузамещенный, * микрокристаллическая целлюлоза, * натрия кроскармеллоза, * кислота стеариновая, * магния стеарат. Оболочка: * гидроксипропил метилцеллюлоза, * титана двуокись (E171), * триацетин.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Всасывание Биодоступность глюкозамина при приеме внутрь – 25% (за счет эффекта первого прохождения через печень). Биодоступность хондроитин сульфата - 13%. РаспределениеРаспределяется в тканях: наибольшие концентрации глюкозамина обнаруживаются в печени, почках и суставном хряще. Около 30% принятой дозы длительно персистируют в костной и мышечной ткани. Выведение Глюкозамин выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде; частично - с калом. T1/2 глюкозамина - 68 ч.

Показания

Остеоартроз периферических суставов и позвоночника.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 15 лет по 1 таблетке 2 раза в день в течение трех первых недель; по 1 таблетке 1 раз в день в течение последующих недель и месяцев. Устойчивый лечебный эффект достигается при приеме препарата не менее 6 месяцев.

Противопоказания

Гиперчувствительность, выраженное нарушение функции почек. С осторожностью: кровотечения или склонность к кровотечениям, бронхиальная астма, сахарный диабет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Глюкозамин: возможны легкие нарушения функции ЖКТ (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор), головокружение, кожные аллергические реакции. Хондроитин: аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Артра не сообщалось. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении возможно усиление действия антикоагулянтов и антиагрегантов. Повышает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусинтетических пенициллинов. Артра совместим с НПВП и ГКС.

Особые указания

Использование в педиатрииКлинические данные об эффективности и безопасности применения препарата Артра у детей в возрасте до 15 лет отсутствуют.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНет данных.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре 10–30 °C