Инструкция по применению
Артра Таблетки покрытые оболочкой 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глюкозамин+Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 500 мг+500 мг
Срок годности: 60.0

Описание

Двояковыпуклые таблетки овальной формы, покрытые пленочной оболочкой от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, с вкраплениями, с гравировкой "ARTRA" с одной стороны таблетки, со специфическим запахом.Глюкозамин и хондроитинсульфат - это натуральные компоненты, которые обладают выраженными хондропротективными свойствами, такими как улучшение метаболизма хряща, замедление деструкции хряща.Глюкозамин участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты,необходимых для формирования суставного хряща и синтеза коллагена, способствует нормальному отложению кальция в костной ткани. Хондроитинсульфат является высокомолекулярным полисахаридом, который содержится в значительных количествах в соединительной ткани (в особенности в хрящевой). За счет вязкости и особенностей химической структуры хондроитинсульфат препятствует сжатию соединительной ткани и играет роль своеобразной смазки суставных поверхностей.Комбинация глюкозамина и хондроитинсульфата оказывает питательную поддержку суставам и соединительной ткани, препятствует разрушению и способствует восстановлению хрящевой ткани, оказывает противовоспалительное действие, участвует в формировании связок, костей,соединительной ткани.«Глюкозамин-хондроитиновый комплекс» - биологически активная добавка, регулирующая обмен в хрящевой ткани. Оказывает питательную поддержку суставам и соединительной ткани, препятствует разрушению и способствует восстановлению хрящевой ткани, оказывает противовоспалительное действие,участвует в формировании связок, костей, соединительной ткани. Эффективность БАД «Глюкозамин-хондроитинового комплекса» доказана клиническими испытаниями, проведенными в Центре вертеброневрологии СПбГПМА. Специалисты Центра рекомендуют включать «Глюкозамин-хондроитиновый комплекс» в комплексную терапию при лечении остеоартроза, что позволяет добиться стойкого положительного эффекта, а именно: значительно уменьшить боли в пораженных суставах,уменьшить скованность суставов,улучшить функциональное состояние суставов,значительно улучшить качество жизни пациентов.Клинически доказано, что «Глюкозамин-хондроитиновый комплекс» обладает хорошей переносимостью и высокой безопасностью.

Действующее вещество

Глюкозамин+Хондроитина сульфат

Состав

Одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит Активные действующие вещества: Глюкозамина гидрохлорид 500 мг Хондроитин сульфат натрия 500 мг Вспомогательные вещества: кальция фосфат двузамещенный - 230 мг, микрокристаллическая целлюлоза - 185 мг, натрия кроскармеллоза - 80 мг, кислота стеариновая - 70 мг, магния стеарат - 10 мг. Оболочка: Гидроксипропил метилцеллюлоза 35 мг, титана двуокись (Е171) - 8,2 мг, триацетин - 6,8 мг.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Биодоступность глюкозамина при пероральном приеме - 25% (эффект "первого прохождения" через печень). Распределяется в тканях: наибольшие концентрации обнаруживаются в печени, почках и суставном хряще. Около 30% принятой дозы длительно персистируют в костной и мышечной ткани. Экскретируется преимущественно с мочой в неизменном виде, частично с калом. T1/2 - 68 ч. Биодоступность хондроитин сульфата около 13%.

Показания

Остеоартроз периферических суставов и позвоночника.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 15 лет по 1 таблетке 2 раза в день в течение трех первых недель, по 1 таблетке 1 раз в день в течение последующих недель и месяцев. Устойчивый лечебный эффект достигается при приеме препарата не менее 6 месяцев.

Противопоказания

Гиперчувствительность, выраженное нарушение функции почек.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется принимать во время беременности и лактации.

Побочные действия

Глюкозамин: возможны легкие нарушения функции ЖКТ (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор), головокружение, кожные аллергические реакции. Хондроитин: аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: случаи передозировки неизвестны. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно усиление действия антикоагулянтов и антиагрегантов. Артра, увеличивает абсорбцию тетрациклинов, снижает действие полусинтетических пенициллинов. Препарат совместим с глюкокортикоидными препаратами.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Нет данных.

Условия хранения

В сухом месте