# Инструкция по применению
# Артро-Актив Первая помощь Капсулы 300 мг 36 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Диод
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 36
Срок годности: 24.0




## Описание

Капсулы «Артро-Актив® Первая помощь» сочетают в себе эффективность и безопасность за счет направленных механизмов действия и отсутствия побочных эффектов: Благодаря такому комбинированному действию, воспаление в суставе уменьшается, и боль затихает. А поскольку эти вещества - блокаторы воспаления - не влияют на ЦОГ-фермент, они лишены побочных эффектов, характерных для традиционных нестероидных противовоспалительных препаратов. В сравнительных доклинических исследованиях капсулы «Артро-Актив® Первая помощь» оказались схожи по эффективности с препаратом диклофенаком натрия - «золотым стандартом» в лечении суставов. Клиническое применение линии «Артро-Актив®» проводилось в клинике травматологии и ортопедии ММА им. И.М. Сеченова, в РГМУ на кафедре реабилитации и спортивной медицины, в МГМСУ на кафедре клинической фармакологии, в РНЦ Восстановительной медицины и курортологии. «Артро-Актив®» включен в методические рекомендации «Остеоартроз в общемедицинской практике» по лечению остеортроза для врачей общей практики, семейных врачей, терапевтов, неврологов и ревматологов. Прием капсул «Артро-Актив® Первая помощь» способствует:

**Состав**

1 капсула (300 мг) содержит: экстракт семян масляный Pinus sibirica Du Tour (кедра сибирского) и корней Curcuma longa L. (куркумы) - 267 мг; экстракт смолы сухой Boswellia seratta (ладанного дерева) - 30 мг; масло натуральное эфирное лимонное - 3 мг. Состав оболочки: желатин, кармуазин (пищевой краситель).

**Форма выпуска**

Капсулы

**Показания**

Капсулы «Артро-Актив® Первая помощь» рекомендованы: при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника и суставов: остеоартрозе, остеохондрозе, в остром периоде после переломов костей и ряда операций на суставах, при болевых синдромах в области шеи, спины и суставов.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, во время еды, запивая водой. Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 капс. 2–3 раза в день. Продолжительность приема — 2–4 нед. Рекомендуемый перерыв между курсами — 2 нед.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

**Особые указания**

БАД. Не является лекарственным средством.

**Условия хранения**

В сухом месте