Инструкция по применению
Артродарин Капсулы 50 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Аргентина
Производитель: ТРБ Фарма С.А.
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Диацереин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 50 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Диацереин

Состав

Действующее вещество: ДиацереинВспомогательные вещества: лактоза моногидрат, кроскармелезы натриевая соль, повидон К30, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, индиготин (Е-132), окись железа желтая (Е-172), окись титана (Е-171), желатин. Концентрация действующего вещества (мг): 50 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание и метаболизмПосле приема препарата внутрь диацереин быстро абсорбируется из ЖКТ и полностью деацетилируется до реина. Прием препарата одновременно с пищей увеличивает биодоступность на 25%. Cmax реина в плазме достигается через 144 мин. При однократном приеме препарата в дозе 50 мг Cmax достигает 3.15 мг/л. При многократном приеме препарата Cmax реина повышается в связи с кумуляцией.Распределение и выведениеСвязывание реина с альбумином достигает практически 100%. Реин проникает через ГЭБ и плацентарный барьер. T1/2 составляет 255 мин. Реин выводится почками в неизмененном виде (20%) и в виде глюкуронида (60%) и сульфата (20%).

Показания

Первичный и вторичный остеоартроз.

Способ применения и дозы

Стандартный прием по 1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером, после еды). Капсулы следует проглатывать целиком, не разжевывая, и запивать водой. Эффект от лечения следует ожидать через 2-4 недели. Артродарин принимается непрерывно длительно или курсами продолжительностью не менее 4 месяцев.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата или высокая чувствительность к антрахионовым препаратам (например, слабительным средствам). Детский возраст (до 18 лет). Беременность, период лактации. С осторожностью применять Пациентам с раздражением нижних отделов кишечника препарат назначается только в особых случаях. Крайне осторожно следует применять препарат и при наличии хронической почечной недостаточности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Побочные действия

При повышенной чувствительности к компонентам препарата могут отмечаться аллергические реакции различной степени. В начальном периоде приема препарата временно могут иметь место явления со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, рвота, боль в животе. В этом случае дозировка может быть снижена до 1 капсулы в день. В процессе лечения может иметь место интенсивное окрашивание мочи от желтого до коричневого цвета (в зависимости от pH), что не требует снижения дозы (отмены) препарата.

Передозировка

Симптомы: диарея, слабость.Лечение: симптоматическое. Пациент должен быть предупрежден о необходимости обратиться к врачу в случае передозировки.

Взаимодействие с другими препаратами

Артродарин не следует принимать одновременно с веществами, влияющими на качество содержимого кишечника и скорость его опорожнения (в т.ч. с большим количеством клетчатки).Антациды уменьшают абсорбцию препарата.При одновременном применении с антибиотиками или с химиотерапевтическими препаратами, влияющими на микрофлору кишечника, возможно повышение частоты нежелательных реакций со стороны кишечника.

Особые указания

Продолжительность терапии в зависимости от достигнутого результата может быть длительной.До достижения терапевтического эффекта Артродарин следует назначать одновременно с анальгетиками и НПВС.На фоне приема препарата требуется периодический контроль картины периферической крови и активности печеночных ферментов.При ухудшении функции почек следует снизить дозу препарата.

Условия хранения

В сухом месте