Инструкция по применению
Артрокер Капсулы 50 мг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Индия
Производитель: Микро Лабс Лимитед
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Диацереин
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 50 мг



Действующее вещество

Диацереин

Состав

Диацереин 50 мг

Форма выпуска

Капсулы

Показания

— первичный и вторичный остеоартроз.

Способ применения и дозы

Стандартный прием по 1 капсуле 2 раза /сут (утром и вечером) после еды. Капсулы следует проглатывать целиком, не разжевывая, и запивать водой. Эффект от лечения следует ожидать через 2-4 недели. Артрокер применяется непрерывно длительно или курсами продолжительностью не менее 4 месяцев. Длительность перерыва между курсами лечения устанавливает врач.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость компонентов препарата или высокая чувствительность к антрахиноновым препаратам (например, слабительным средствам) . — детский возраст (до 18 лет) . — беременность . — период лактации . — тяжелая печеночная недостаточность . — тяжелая почечная недостаточность . — кишечная непроходимость . — воспалительные заболевания кишечника . — непереносимость лактозы, дефицит лактазы . — глюкозогалактозная мальабсорбция. С осторожностью: пациентам с раздражением нижних отделов кишечника препарат назначается только в особых случаях.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Побочные действия

При повышенной чувствительности к компонентам препарата могут отмечаться аллергические реакции различной степени, сыпь, зуд. В начальном периоде приема препарата временно могут иметь место явления со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, рвота, боль в животе. В этом случае доза должна быть снижена до 1 капс./сут. Может иметь место интенсивное окрашивание мочи от желтого до коричневого цвета (в зависимости от pH), что не требует снижения дозы (отмены) препарата.

Особые указания

При повышенной чувствительности к компонентам препарата могут отмечаться аллергические реакции различной степени, сыпь, зуд. В начальном периоде приема препарата временно могут иметь место явления со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, рвота, боль в животе. В этом случае доза должна быть снижена до 1 капс./сут. Может иметь место интенсивное окрашивание мочи от желтого до коричневого цвета (в зависимости от pH), что не требует снижения дозы (отмены) препарата.