Инструкция по применению
Артрозан Таблетки 15 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мелоксикам
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 15 мг
Срок годности: 36

Описание

Таблетки от светло-желтого до желтого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской. Допускается незначительная мраморность.

Действующее вещество

Мелоксикам

Состав

Состав на одну таблетку _Действующее вещество:_ мелоксикам - 15,0 мг; _Вспомогательные вещества:_ для дозировки 15,0 мг: крахмал картофельный - 94,5 мг, лактозы моногидрат - 150,0 мг, повидон (поливинилпирролидон, повидон К-25) - 4,5 мг, натрия цитрат - 27,0 мг, магния стеарат - 3,0 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 6,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Симптоматическое лечение: * остеоартрит (артроз, дегенеративные заболевания суставов), в том числе с болевым компонентом; * ревматоидный артрит; * анкилозирующий спондилит; * ювенильный ревматоидный артрит (у пациентов с массой тела >gt; 60 кг); * другие воспалительные и дегенеративные заболевания костно-мышечной системы, такие как артропатии, дорсопатии (например, ишиас, боль внизу спины, плечевой периартрит и другие), сопровождающиеся болью. Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Применение мелоксикама противопоказано во время беременности. _Период грудного вскармливания_ Известно, что НПВП проникают в грудное молоко, поэтому применение мелоксикама в период грудного вскармливания противопоказано. Как препарат, ингибирующий синтез циклооксигеназы /простагландинов мелоксикам может оказывать влияние на фертильность, и поэтому не рекомендуется его применение у женщин, планирующих беременность. Мелоксикам может приводить к задержке овуляции. В связи с этим у женщин, имеющих проблемы с зачатием и проходящим обследование по поводу подобных проблем, рекомендуется отмена приема мелоксикама.

Передозировка

Симптомы: нарушение сознания, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, кровотечение в желудочно-кишечном тракте, острая почечная недостаточность, печеночная недостаточность, остановка дыхания, асистолия. _Лечение:_ специфических антидотов и антагонистов нет. При передозировке препарата - промывание желудка, прием активированного угля (в течение ближайшего часа), симптоматическая терапия. Форсированный диурез, защелачивание мочи, гемодиализ малоэффективны из-за высокой связи препарата с белками крови.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.