Инструкция по применению
Артрозилен Пена для наружного применения 15% 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Пена
Страна: Германия
Производитель: Си Эс Си
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кетопрофен
Количество в упаковке: 1



Описание

Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.

Действующее вещество

Кетопрофен

Состав

Кетопрофена лизиновая соль, диэтилфталат - 2.286 мг, карбоксиполиметилен - 32.857 мг, магния стеарат - 15.857 мг, повидон - 27.857 мг, полимеры акриловой и метакриловой кислот - 34.143 мг, тальк - 27 мг.

Форма выпуска

Пена

Показания

Суставной синдром (ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагра), симптоматическое лечение воспалительно-дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата (периартрит, артросиновит, тендинит, тендосиновит, бурсит, люмбаго), боли в позвоночнике, невралгии, миалгии. Неосложненные травмы, в частности спортивные, вывихи, растяжение или разрыв связок и сухожилий, ушибы, посттравматические боли.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Противопоказания

Для приема внутрь: эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения, "аспириновая триада", выраженные нарушения функции печени и/или почек, III триместр беременности, возраст до 15 лет (для таблеток ретард), повышенная чувствительность к кетопрофену и салицилатам.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: боли в эпигастральной области, тошнота, рвота, запор или диарея, анорексия, гастралгии, нарушения функции печени, редко - эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, кровотечения и перфорации ЖКТ.Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, шум в ушах, сонливость.Со стороны мочевыделительной системы: нарушения функции почек.Аллергические реакции: кожная сыпь, редко - бронхоспазм.Местные реакции: при применении в форме свечей возможны раздражение слизистой оболочки прямой кишки, болезненная дефекация, при применении в форме геля - зуд, кожная сыпь в месте нанесения.