Инструкция по применению
АСД Капли 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: АВЗ С-П
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Состав

Сырье для БАД «АСД®-2Б», фолиевая кислота, селен (натрия селинит пентагидрат).

Форма выпуска

Капли

Показания

Рекомендуется в качестве источника фолиевой кислоты и селена. Восстанавливает адаптационные и антиоксидантные возможности организма. Это повышает эффективность лечения, сокращает сроки лечения, способствует восстановлению после перенесенных заболеваний, физических нагрузок, пребывания в экстремальных условиях и повышает устойчивость к патогенным агентам, физическим и эмоциональным перегрузкам, стрессам.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по 1,5 мл (20 капель) 1 раз в день,растворив в 150 мл воды или по 0,75 мл (10 ка- пель) 2 раза в день,растворив в 100 мл воды,за 15 ми- нут до еды. Продолжительность приема– 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. АСД применяют внутрь, растворив его непосредственно перед употреблением в стакане прохладной любимой минеральной воды с газом. Наименование Содержание в суточной дозе (1,5 мл) Адекватный уровень потребления, мкг % от адекватного уровня потребления Фолиевая кислота 120 мкг 200 60 Селен 21 мкг 70 30 Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Gротивопоказано: беременность, кормление грудью.

Особые указания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. В случае возник- новения аллергических реакций прекратить применение и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C. После вскрытия флакон плотно закрывать и хранить в холодильнике. При хранении допускается образование осадка коричневого цвета, не влияющего на качество продукта.