Инструкция по применению
Асклезан А Капсулы 0,3г 36 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ВИС
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лещина экстракт + Дигидрокверцетин + Рутин + Витамин С (аскорбиновая кислота)
Количество в упаковке: 36
Дозировка действующего вещества: 300 мг
Срок годности: 2 года

Описание

АСКЛЕЗАН-А капсулы – это биокомплекс на основе экстракта лещины для нормализации венозного тонуса. В состав АСКЛЕЗАН-А входят компоненты, которые способствуют облегчению симптомов, сопровождающих течение заболеваний вен, оказывая воздействие на ключевые звенья патогенеза. Благодаря свойствам компонентов Асклезан-Б (экстракт лещины), рутина и витамина С, комплекс способствует повышению венозного тонуса, улучшению венозного и лимфатического оттока (уменьшению отеков) в нижних конечностях при тяжести, усталости и отечности ног. Рекомендуемый суточный прием АСКЛЕЗАН-А (1 капсула) содержит: • дигидрокверцетина – 8,25 мг (33% от адекватного уровня потребления); • рутина – 25 мг (83% от адекватного уровня потребления); • витамина С – 39 мг (65% от рекомендуемого уровня суточного потребления).

Действующее вещество

Лещина экстракт + Дигидрокверцетин + Рутин + Витамин С (аскорбиновая кислота)

Состав

Активные компоненты: «Асклезан Б» (экстракт лещины), дигидрокверцетин, рутин, витамин С. Вспомогательные компоненты: желатин (капсула), микроскопическая целюлоза (носитель), магния оксид (антислеживающий агент), стеарат кальция (антислеживающий агент)

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Венотоник, для нормализации венозного тонуса. Комплекс способствует повышению венозного тонуса, улучшению венозного и лимфатического оттока (уменьшает отеки) в нижних конечностях при тяжести, усталости и отечности ног.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма – не менее 2 месяцев. Прием рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

в сухом защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше + 25°С