Инструкция по применению
Аскорутин ЭКО таблетки 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Экотекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аскорбиновая кислота+Рутозид
Количество в упаковке: 50



Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с вкраплениями, с плоской поверхностью, с фаской и риской.

Действующее вещество

Аскорбиновая кислота+Рутозид

Состав

Активные вещества: аскорбиновая кислота, рутозид.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Гипо- и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен трофических нарушениях и язвах кожи при хронической венозной недостаточности при геморрагическом диатезе.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в сутки во время или после приема пищи. Курс лечения составляет 2-3 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата детский возраст беременность (I триместр) дефицит сахаразы/изомальтазы непереносимость фруктозы глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Из-за содержания в препарате рутина препарат не следует применять в I триместре беременности. При применении в период беременности (II-III триместры) и грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом. При употреблении препарата необходимо в период беременности и грудного вскармливания соблюдать дозировку и длительность курса приема назначенные врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь) диспепсические расстройства головная боль.

Передозировка

Применение чрезмерных доз препарата может вызвать тошноту рвоту понос головную боль. Лечение: симптоматическое форсированный диурез.

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина железа, снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов что требует коррекции доз при их одновременном применении.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать что в одной таблетке препарата содержится около 015 т углеводов (0014 ХН). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.