Инструкция по применению
Аскорбиновая кислота с глюкозой таблетки 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аскорбиновая кислота+Декстроза
Количество в упаковке: 40

Описание

Таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, с риской на одной стороне и маркировкой "R" или без нее - на другой.

Действующее вещество

Аскорбиновая кислота+Декстроза

Состав

Аскорбиновая кислота 0,1 гДекстрозы моногидрат 0,877 гВспомогательные вещества: крахмал картофельный 0,013 гстеариновая кислота 0,008 гкальция стеарат 0,002 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика гиповитаминоза витамина С. Обеспечение повышенной потребности организма в витамине С в период роста беременности грудного вскармливания при высоких физических и умственных нагрузках при переутомлении в период выздоровления после длительных и тяжелых заболеваний.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды.С профилактической целью назначают: Взрослым - по ½ - 1 таблетке в сутки.В период беременности и лактации по 3 таблетки в сутки в течение 10-15 дней затем по 1 таблетке в сутки.С лечебной целью назначают:Взрослым - по ½ - 1 таблетке в 3-5 раз в день.Детям - по ½ - 1 таблетке 2-3 раза в день.Срок лечения зависит от характера и течения заболевания и рекомендуется врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата детский возраст (до 3-х лет). Не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови тромбофлебитами и склонностью к тромбозам а также при сахарном диабете и состояниях сопровождающихся повышенным содержанием сахара в крови.

Применение при беременности и кормлении грудью

Аскорбиновая кислота проникает через плацентарный барьер. Следует иметь в виду что плод может адаптироваться к высоким дозам аскорбиновой кислоты которую принимает беременная женщина и затем у новорожденного возможно развитие аскорбиновой болезни как реакции отмены. Поэтому при беременности не следует принимать аскорбиновую кислоту в повышенных дозах за исключением случаев когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск.Аскорбиновая кислота выделяется с грудным молоком. Диета матери содержащая адекватное количество аскорбиновой кислоты достаточна для профилактики ее дефицита у грудного ребенка. Рекомендуется не превышать кормящей матерью максимум ежедневной потребности в аскорбиновой кислоте за исключением случаев когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. Гипервитаминоз витамина С. Раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (тошнота рвота диарея спазм желудочно-кишечного тракта), угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия глюкозурия), при применении в высоких дозах - гипероксалурия и нефрокальциноз (оксалатный). Изменение лабораторных показателей: тромбоцитоз гиперпротромбинемия эритропения нейтрофильный лейкоцитоз гипокалиемия.

Передозировка

Симптомы: при длительном применении больших доз (более 1 г) - головная боль повышение возбудимости центральной нервной системы бессонница тошнота рвота диарея гиперацидный гастрит ульцерация слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия глюкозурия) гипероксалурия. нефролитиаз (из кальция оксалата) повреждение гломерулярного аппарата почек умеренная поллакиурия (при приеме дозы более 600 мг/сут). Снижение проницаемости капилляров (возможно ухудшение трофики тканей повышение артериального давления гиперкоагуляция развитие микроангиопатий).Лечение: в случае приема внутрь потенциально токсической дозы вызывают рвоту в редких случаях - промывают желудок назначают активированный уголь слабительные средства (например изотонический раствор сульфата натрия).

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов, в дозе 1 г/сут повышает биодоступность этинилэстрадиола (в том числе входящего в состав пероральных контрацептивов).Улучшает всасывание в кишечнике препаратов железа (переводит трехвалентное железо в двухвалентное), может повышать выведение железа при одновременном применении с дефероксамином.Снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов. Ацетилсалициловая кислота пероральные контрацептивы свежие соки и щелочное питье снижают всасывание и усвоение.При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается выведение с мочой аскорбиновой кислоты и снижается выведение ацетилсалициловой кислоты. Ацетилсалициловая кислота снижает абсорбцию аскорбиновой кислоты примерно на 30%. Увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия замедляет выведение почками кислот увеличивает выведение лекарственных средств имеющих щелочную реакцию (в том числе алкалоидов) снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов. Повышает общий клиренс этанола который в свою очередь снижает концентрацию аскорбиновой кислоты в организме.Лекарственные средства хинолинового ряда хлористый кальций салицилаты глюкокортикостероиды при длительном применении истощают запасы аскорбиновой кислоты. При одновременном применении уменьшает хронотропное действие изопреналина. При длительном применении или применении в высоких дозах может нарушать взаимодействие дисульфирам-этанол.В высоких дозах повышает выведение мексилетина почками уменьшает терапевтическое действие антипсихотических лекарственных средств (нейролептиков) - производных фенотиазина канальцевую реабсорбцию амфетамина и трициклических антидепрессантов.Барбитураты и примидон повышают выведение аскорбиновой кислоты с мочой.

Особые указания

В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на образование глюкокортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией почек и артериальным давлением. При длительном применении больших доз возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы поэтому в процессе лечения необходимо регулярно контролировать функциональную способность поджелудочной железы.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами работать с точными механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В пачке в сухом месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.