Инструкция по применению
Аскорил БС Раствор для приема внутрь 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Индия
Производитель: Гленмарк
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол
Количество в упаковке: 1

Описание

Раствор для приема внутрь в виде прозрачной, бесцветной или желтоватой жидкости с характерным запахом.

Действующее вещество

Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол

Состав

Состав на 5 мл:Действующие вещества:Бромгексина гидрохлорид 2,0 мг,Гвайфенезин 50,0 мг,Сальбутамола сульфат 1,2 мг, эквивалентный сальбутамолу 1,0 мг. Вспомогательные вещества: натрия бензоат, натрия цитрат, натрия хлорид, сукралоза, лимонной кислоты моногидрат, ароматизатор черносмородиновый* (отдушка «Черная смородина» ID 20158, Black Currant ID 20158), ароматизатор ананасовый** (отдушка «Ананас» Super PH, Pineapple Super PH Flavour), левоментол, вода очищенная.* Ароматизатор черносмородиновый: пропиленгликоль 1520, вода, ароматизаторы, идентичные натуральным, этанол, вкусоароматический препарат, искусственное вкусоароматическое вещество, натуральное вкусоароматическое вещество.** Ароматизатор ананасовый: вкусоароматический препарат, ароматизаторы, идентичные натуральным, пропиленгликоль 1520, искусственное вкусоароматическое вещество.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Острый бронхит, включая трахеобронхит, острый бронхит, обусловленный респираторными вирусами, хронический бронхит без дополнительного уточнения (БДУ), ХОБЛ, астматический бронхит, пневмония.

Способ применения и дозы

Препарат должен назначаться врачом.Применять препарат не более 4-5 дней. Если симптомы сохраняются более 4-5 дней, следует обратиться к врачу.Режим дозированияВзрослые: 10 мл раствора 3 раза в сутки.ДетиПодростки старше 12 лет: режим дозирования аналогичен таковому у взрослых.Детям от 6 до 12 лет: 5 10 мл раствора 3 раза в сутки.Детям от 2 до 6 лет: 5 мл раствора 3 раза в сутки.Препарат Аскорил БС, раствор для приема внутрь, противопоказан детям в возрасте до 2 лет (см. раздел Противопоказания).Способ примененияПрепарат предназначен для приема внутрь.Рекомендуется использовать мерный колпачок.Перед употреблением взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бромгексину, гвайфенезину, сальбутамолу, беременность, период грудного вскармливания, тахиаритмия, миокардит, пороки сердца (в т. ч. аортальный стеноз), декомпенсированный сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, желудочное кровотечение, детский возраст до 2 лет.С осторожностьюСахарный диабет, артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии, гипертиреоз, стенокардия, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях бронхов, сопровождающихся чрезмерным скоплением секрета.Не следует применять в сочетании с бета-адреноблокаторами.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто - тахикардия, редко - аритмии, включая фибрилляцию предсердий, наджелудочковую тахикардию и экстрасистолию, расширение периферических сосудов, частота неизвестна - ишемия миокарда.Со стороны нервной системы: очень часто - тремор, часто - головная боль, очень редко - гиперактивность.Со стороны пищеварительной системы: возможно – обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, тошнота, рвота, диарея и боль в верхних отделах живота.Со стороны кожи и подкожных тканей: возможны тяжелые кожные побочные реакции, в т.ч. многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез.Со стороны иммунной системы: возможно - ангионевротический отек, сыпь, крапивница, зуд, гиперчувствительность, анафилактическая реакция, анафилактический шок.Со стороны обмена веществ: редко - гипокалиемия.Со стороны костно-мышечной системы: часто - мышечные судороги, очень редко - ощущение мышечного напряжения.Со стороны дыхательной системы: возможно - бронхоспазм.Со стороны почек и мочевыделительной системы: возможно - окрашивание мочи в розовый цвет.

Взаимодействие с другими препаратами

Теофиллин и другие ксантины при одновременном применении повышают вероятность развития тахиаритмий.Входящий в состав комбинации сальбутамол не рекомендуется пациентам, которые получают ингибиторы МАО и/или трициклические антидепрессанты.Применять с осторожностью совместно со средствами для анестезии, такими как хлороформ, циклопропан, галотан и другими галогенсодержащими препаратами.Не рекомендуется применять данную комбинацию одновременно с неселективными блокаторами бета-адренорецепторов, такими как пропранололДиуретики и ГКС усиливают гипокалиемический эффект сальбутамола. Одновременный прием с препаратами, содержащими кодеин, и другими противокашлевыми средствами затрудняет отхождение разжиженной мокроты. Входящий в состав препарата бромгексин способствует проникновению антибиотиков в легочную ткань.

Особые указания

БромгексинПациентов необходимо предупредить о возможном усилении секреции слизи.При возникновении поражений кожи или слизистых оболочек следует немедленно обратиться за медицинской помощью и в качестве меры предосторожности прекратить прием бромгексина гидрохлорида.ГвайфенезинНе применять одновременно с препаратами, подавляющими кашель или комбинированными противопростудными препаратами.Гвайфенезин окрашивает мочу в розовый цвет.При избыточном применении гвайфенезин может вызывать образование камней в почках.В случае сбора мочи в пределах 24 ч после приема гвайфенезина его метаболит может изменить цвет мочи, и лабораторно может определяться 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК) и ванилилминдальная кислота (ВМК).СальбутамолБронходилататоры не следует применять в качестве единственного или основного лекарственного средства при лечении пациентов с тяжелым или нестабильным течением бронхиальной астмы. При тяжелой бронхиальной астме необходимо проведение регулярной оценки состояния, включая определение функции легких, так как у пациентов есть риск возникновения тяжелых приступов и даже смертельного исхода. Если лечение становится неэффективным, пациентам следует обратиться за медицинской помощью.Дозу или частоту применения следует повышать только по рекомендациям врача.Сальбутамол вызывает периферическую вазодилатацию, которая может сопровождаться рефлекторной тахикардией и увеличением сердечного выброса или тиреотоксикозом. Следует применять с осторожностью у пациентов, страдающих стенокардией, тяжелыми формами тахикардии или тиреотоксикозом.Как и другие агонисты бета-адренорецепторов, сальбутамол может вызывать обратимые метаболические изменения, например, повышение концентрации глюкозы в крови. Пациенты с сахарным диабетом могут быть неспособны компенсировать повышение концентрации глюкозы в крови, и у таких пациентов сообщалось о развитии кетоацидоза.Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмамиУчитывая профиль побочных эффектов (головокружение, сонливость и другие) рекомендуется во время лечения воздержаться от управления транспортными средствами и механизмами, от занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.Применение при нарушениях функции печениПротивопоказано применение при печеночной недостаточности.Применение при нарушениях функции почекПротивопоказано применение при почечной недостаточности.Применение у детейПротивопоказано применение у детей в возрасте до 2 лет.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для детей месте, так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните препарат при температуре не выше 25 °С.