Инструкция по применению
Аскорил Таблетки 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 8 мг+100 мг+2 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол

Состав

Сальбутамол (в форме сульфата) 2 мг,бромгексина гидрохлорид 8 мг, гвайфенезин 100 мг.Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат, крахмал кукурузный, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), тальк очищенный, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Сальбутамол: Всасывание и распределение: При приеме внутрь абсорбция высокая. Биодоступность сальбутамола при приеме внутрь составляет около 50%. Прием пищи снижает скорость абсорбции, но не влияет на биодоступность. Связывание с белками плазмы - 10%. Проникает через плацентарный барьер. Метаболизм и выведение: Подвергается пресистемному метаболизму в печени и в кишечной стенке, посредством фенолсульфотрансферазы инактивируется до 4-о-сульфата эфира. T1/2 - 3.8-6 ч. Выводится почками (69-90%), преимущественно в виде неактивного фенолсульфатного метаболита (60%) в течение 72 ч и с желчью (4%). Бромгексин: Всасывание и распределение: При приеме внутрь практически полностью (99%) всасывается из ЖКТ в течение 30 мин. Биодоступность - низкая (т.к. подвергается эффекту первого прохождения через печень). Проникает через плацентарный барьер и ГЭБ. Метаболизм и выведение: В печени подвергается деметилированию и окислению, метаболизируется до фармакологически активного амброксола. T1/2 - 15 ч (вследствие медленной обратной диффузии из тканей). Выводится почками. При хронической почечной недостаточности нарушается выведение метаболитов. При многократном применении может кумулировать. Гвайфенезин: Всасывание и распределение: Абсорбция из ЖКТ - быстрая (через 25-30 мин после приема внутрь). Проникает в ткани, содержащие кислые мукополисахариды. Метаболизм и выведение: Примерно 60% введенного препарата подвергается метаболизму в печени. T1/2 - 1 ч. Выводится легкими (с мокротой) и почками как в неизменном виде, так и в виде неактивных метаболитов.

Показания

В составе комбинированной терапии острых и хронических бронхо-легочных заболеваний, сопровождающихся образованием трудно отделяемого вязкого секрета: — бронхиальная астма— трахеобронхит— обструктивный бронхит— пневмония— эмфизема легких— коклюш— пневмокониоз— туберкулез легких.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут или по 10 мл сиропа Аскорил экспекторант (2 чайные ложки) 3 раза/сут. Детям в возрасте от 6 лет до 12 лет – по 1/2 или 1 таб. 3 раза/сут или по 5-10 мл сиропа Аскорил экспекторант (1-2 чайные ложки) 3 раза/сут. Детям в возрасте до 6 лет рекомендуется применение сиропа Аскорил экспекторант по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза/сут.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата— беременность, период лактации— тахиаритмия, миокардит— пороки сердца— декомпенсированный сахарный диабет— тиреотоксикоз— глаукома— печеночная или почечная недостаточность— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения— желудочное кровотечение— артериальная гипертензия (для применения таблеток)— детский возраст до 6 лет (для применения таблеток).С осторожностью препарат в форме таблеток назначают пациентам с сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии.

Условия хранения

В сухом месте