Инструкция по применению
Аскорил Таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 8 мг+100 мг+2 мг

Описание

Таблетки Аскорил применяются в составе комбинированной терапии острых и хронических бронхо-легочных заболеваний, сопровождающихся образованием трудно отделяемого вязкого секрета в качестве отхаркивающего средства.

Действующее вещество

Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол

Состав

Сальбутамол (в форме сульфата) 00092 мг, бромгексина гидрохлорид 00098 мг, гвайфенезин 0009100 мг.Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат, крахмал кукурузный, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), тальк очищенный, диоксид кремния коллоидный, стеарат магния.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В составе комбинированной терапии острых и хронических бронхо-легочных заболеваний, сопровождающихся образованием трудно отделяемого вязкого секрета: бронхиальная астма, трахеобронхит, обструктивный бронхит, пневмония, эмфизема легких, коклюш, пневмокониоз, туберкулез легких.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь.Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут. Детям в возрасте от 6 лет до 12 лет – по 1/2 или 1 таб. 3 раза/сут.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности применять препарат не рекомендуется.При необходимости лечения препаратом в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Редко: при применении в высоких дозах иногда наблюдаются головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги, тошнота, рвота, диарея, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, учащенное сердцебиение, возможно окрашивание мочи в розовый цвет, аллергические реакции (сыпь, крапивница), коллапс, бронхоспазм.

Передозировка

Симптомы: возможно усиление проявлений побочных эффектов.Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Другие бета2-адреномиметические средства и теофиллин усиливает действие сальбутамола и увеличивают вероятность появления побочных эффектов. Аскорил не назначают одновременно с препаратами, содержащими кодеин, и другими противокашлевыми средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты. Входящий в состав препарата Аскорил бромгексин способствует проникновению антибиотиков (эритромицин, цефалексин, окситетрациклин) в легочную ткань. Не рекомендуется применять препарат Аскорил одновременно с неселективными блокаторами бета-адренорецепторов, такими как пропранолол. Входящий в состав препарат Аскорил сальбутамол не рекомендуется пациентам, которые получают ингибиторы МАО. Диуретики и ГКС усиливают гипокалиемический эффект сальбутамола. Не рекомендуется принимать одновременно с Аскорил щелочное питье.

Особые указания

Противопоказания:— повышенная чувствительность к компонентам препарата, — беременность, — период лактации, — тахиаритмия, — миокардит, — пороки сердца,— декомпенсированный сахарный диабет, — тиреотоксикоз, — глаукома, — печеночная или почечная недостаточность, — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, — желудочное кровотечение, — артериальная гипертензия, — детский возраст до 6 лет.