Инструкция по применению
Аскорутин Алтайвитамины Таблетки 50 мг + 50 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аскорбиновая кислота+Рутозид
Количество в упаковке: 1

Описание

Таблетки от желтого до желтого с зеленоватым оттенком цвета с незначительными вкраплениями от зеленого до коричневого цвета, плоскоцилиндрической формы с риской и фаской.

Действующее вещество

Аскорбиновая кислота+Рутозид

Состав

Состав на одну таблетку: Действующие вещества: Аскорбиновая кислота (витамин С) - 50,0 мг Рутозида тригидрат - 54,4 мг в пересчета на рутозид(Рутин) - 50,0 мг Вспомогательные компоненты: Сахароза (сахар белый) - 147,7мг Крахмал картофельный - 68,6 мг Тальк -6,4 мг Кальция стеарат - 2,9 мг Масса таблетки - 330 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Аскорбиновая кислота Всасывание Абсорбируется в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), преимущественно в тощей кишке. С увеличением дозы до 200 мг всасывается до 140 мг (70 %), при дальнейшем повышении дозы всасывание уменьшается (50-20 %). Связь с белками плазмы - 25 %. Заболевания ЖКТ (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, запоры или диарея, глистная инвазия, лямблиоз), употребление свежих фруктовых и овощных соков, щелочного питья уменьшают всасывание аскорбата в кишечнике. Распределение Концентрация аскорбиновой кислоты в плазме в норме составляет приблизительно 10-20 мкг/мл, запасы в организме - около 1,5 г при приеме ежедневных рекомендуемых доз и 2,5 г при приеме 200 мг/сут. TCmax (период полувыведения) после приема внутрь - 4 ч. Легко проникает в лейкоциты, тромбоциты, а затем во все ткани, наибольшая концентрация достигается в железистых органах, лейкоцитах, печени и хрусталике глаза, депонируется в задней доле гипофиза, коре надпочечников, глазном эпителии, межуточных клетках семенных желез, яичниках, печени, селезенке, поджелудочной железе, легких, почках, стенке кишечника, сердце, мышцах, щитовидной железе, проникает через плаценту. Концентрация аскорбиновой кислоты в лейкоцитах и тромбоцитах выше, чем в эритроцитах и в плазме. При дефицитных состояниях концентрация в лейкоцитах снижается позднее и более медленно и рассматривается как лучший критерий оценки дефицита, чем концентрация в плазме. Метаболизм Метаболизируется преимущественно в печени в дезоксиаскорбиновую и далее в щавелевоуксусную кислоту и аскорбат-2-сульфат. Выведение Выводится почками, через кишечник, с потом, грудным молоком в виде неизмененного аскорбата и метаболитов. При назначении высоких доз скорость выведения резко усиливается. Курение и употребление этанола ускоряют разрушение аскорбиновой кислоты (превращение в неактивные метаболиты), резко снижая запасы в организме. Выводится при гемодиализе. Рутозид Время максимальной концентрации в плазме крови после приема внутрь - 1-9 часов. Выводится преимущественно с желчью и в меньшей степени почками. Период полувыведения - 10-25 ч.

Показания

Гипо- и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов: при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности, геморрагическом диатезе.

Способ применения и дозы

Внутрь, по таблетке 2-3 раза в день во время или после приема пищи. Курс лечения 2-3 недели.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст, беременность (1 триместр), врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Из-за содержания в препарате рутина его не следует применять в I триместре беременности. При применении препарата во время беременности (II-III триместры) и в период грудного вскармливания необходимо соблюдать дозировку и длительность курса приема, назначенные врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции, диспепсические расстройства, головная боль. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы Применение чрезмерных доз препарата может вызвать тошноту, рвоту, понос, головную боль. Лечение Симптоматическое, форсированный диурез. Взаимодействие с другими лекарственными средствами Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа, снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает, всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа, снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 0,2 г углеводов (0,02 ХЕ). При самостоятельном применении препарата рекомендуется не превышать максимальные сроки и рекомендуемые дозы.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 оС. Хранить в недоступном для детей месте.