Инструкция по применению
Аскорутин Фармстандарт Таблетки 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аскорбиновая кислота+Рутозид
Количество в упаковке: 50



Описание

Аскорутин ,витамин, содержащий аскорбиновую кислоту и рутозид. Аскорбиновая кислота участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. Рутозид устраняет повышенную проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшая ее отечность и воспаление. Обладает антиагрегантным действием, что способствует улучшению микроциркуляции. Аскорутин применяют в комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности и при геморрагическом диатезе. Таблетки можно принимать как во время, так и после приема пищи. Отпускается без рецепта.

Действующее вещество

Аскорбиновая кислота+Рутозид

Состав

Действующие вещества: аскорбиновая кислота - 50 мг, рутозид - 50 мг.
Вспомогательные вещества: сахароза (сахар белый) - 201,9 мг, крахмал картофельный - 5,46 мг, крахмал кукурузный - 13,54 мг, кальция стеарат - 3,3 мг, тальк - 5,8 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Гипо- и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хрониче-ской венозной недостаточности, при геморрагическом диатезе.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в сутки во время или после приема пищи. Курс лечения - 2-3 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахара-зы/изомальтазы, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Из-за содержания в препарате рутина его не следует применять в I триместре беременности. При употреблении препарата при беременности и в период грудного вскармливания необходимо соблюдать дозировку и длительность курса приема, назначенные врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсические расстройства, головная боль. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заме-тили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Применение чрезмерных доз препарата может вызвать тошноту, рвоту, диарею, головную боль. Лечение: симптоматическое, форсированный диурез.

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа, снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов, что требует коррекции доз при их одновременном применении.

Особые указания

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата со-держится около 0,2 г углеводов (0,017 ХЕ).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте.