Инструкция по применению
Аскорутин Ка Таблетки для рассасывания 18 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: Зелдис
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аскорбиновая кислота+Рутозид
Количество в упаковке: 18

Действующее вещество

Аскорбиновая кислота+Рутозид

Состав

Состав на одну таблетку Действующие вещества Аскорбиновая кислота в пересчете на 100 % вещество - 50,0 мг Рутозида тригидрат - 54,0 мг (в пересчете на рутозид (рутин)) - 50,0 мг

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Гипо- и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутина. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах, при хронической венозной недостаточности, при геморрагическом диатезе.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в сутки во время или после приема пищи. Курс лечения - 2-3 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы, беременность (I триместр), детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно при беременности (II и III триместр) и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсические расстройства, головная боль. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина и железа, снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов, что требует коррекции доз при их одновременном применении.

Особые указания

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 0,2 г углеводов (0,017 ХЕ).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке) при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.