Инструкция по применению
Аскорутин Вилар Таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вилар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аскорбиновая кислота+Рутозид
Количество в упаковке: 1

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от светло-жёлтого до жёлтого цвета с сероватым или зеленоватым оттенком. Допускаются светлые и тёмные вкрапления.

Действующее вещество

Аскорбиновая кислота+Рутозид

Состав

Состав (на одну таблетку) Действующие вещества: Аскорбиновая кислота - 0,05 г (в пересчёте на 100 % вещество) Рутин (рутозид) - 0,05 г (в пересчёте на 100 % вещество) Вспомогательные вещества: сахароза (сахар белый), крахмал картофельный, поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 12600 ± 2700, кремния диоксид коллоидный, кальция стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Гипо- и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности, при геморрагическом диатезе.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в сутки во время или после приема пищи. Курс лечения - 2-3 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Из-за содержания в препарате рутина его не следует применять в I триместре беременности. При употреблении препарат необходимо в период беременности и лактации соблюдать дозировку и длительность курса приема, назначенные врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсические расстройства, головная боль. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Применение чрезмерных доз препарата может вызвать тошноту, рвоту, понос, головную боль. Лечение: симптоматическое, форсированный диурез.

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа, снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов, что требует коррекции доз при их одновременном применении.

Особые указания

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 0,2 г углеводов (0,017 ХЕ).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищённом от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.