**Инструкция по применению**
**Аскорутин-Озон Таблетки 50 шт**

### Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аскорбиновая кислота+Рутозид
Количество в упаковке: 50




### Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с незначительными вкраплениями с риской и фаской.

### Действующее вещество

Аскорбиновая кислота+Рутозид

### Состав

Каждая таблетка содержит действующих веществ: аскорбиновой кислоты 50,0 мг и рутозида в пересчете на безводное вещество 50,0 мг. Вспомогательные вещества: сахароза - 185,7 мг, крахмал картофельный - 38,7 мг, повидон-К25 - 3,5 мг, кальция стеарат - 2,1 мг.

### Форма выпуска

Таблетки

### Показания

Гиповитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности, при геморрагическом диатезе.

**Способ применения и дозы**

Внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в сутки во время или после приема пищи. Курс лечения 2-3 недели.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст, беременность (I триместр), дефицит сахаразы/изомальты, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбация (препарат содержит сахарозу).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Не применять в I триместре беременности. При необходимости препарата во II-III триместрах беременности и в период грудного вскармливания - соблюдать дозировку и длительность курса лечения, назначенные врачом.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсические расстройства, головная боль.

**Передозировка**

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, головная боль. Лечение: симптоматическое. Форсированный диурез.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа, снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

**Особые указания**

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 0,185 г углеводов (0,0185 ХЕ). Не следует превышать дозу и срок лечения. В случае ухудшения симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности.

**Условия хранения**

В защищённом от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.